

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

<b>Contesto</b>	
<b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti	Nome VINCENZO Cognome COLINO Telefono 3200232270 e-mail vincenzo.colino@unito.it
<b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc  N°locali, n° posti letto,  Orari apertura al pubblico,  Orari di lavoro,  Figure professionali  Risorse strumentali	Ospedale Maria Vittoria presso l' Unità Operativa di Cardiologia padiglione "D" 1° piano.  10 camere, 20 posti letto di cui due dedicati esclusivamente al day hospital.  Visite parenti: 13.00 - 14.00; 19.30 - 20.30  matt 07:00-15:00 / pom 14:00-22:00 / notte 23:00-07:00  Medico – Infermiere – Operatore Socio Sanitario  All'interno dell'unità operativa, gli studenti hanno la possibilità di utilizzare diversi presidi biomedicali, quali: elettrocardiografo, sistema telemetrico per il monitoraggio elettrocardiografico, macchina da emogasanalisi e per la misurazione della concentrazione plasmatica del peptide natriuretico atriale (BNP), ecocardiografo portatile per l'incannulamento venoso periferico e monitor-defibrillatore. Inoltre nel periodo di tirocinio saranno individuate con lo studente due giornate osservative per approfondire l'opportunità di apprendimento: una in ambulatorio (ecocardiografia trans toracica e trans esofagea, eco stress, monitoraggio holter 24h, test ergometrico, approfondimento dell'elettrocardiogramma) e una in emodinamica (coronarografia ed eventuale angioplastica, cateterismo cardiaco, impianto di pace-maker e/o defibrillatore).



<p>Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p>Si può usufruire per la pausa psicofisica del locale antistante lo spogliatoio della palazzina C, attrezzato con tavoli e sedie; oppure accedere ai locali mensa attraverso due modalità: 1- Pagare i buoni pasto presso la Tesoreria della Banca San Paolo sita presso il Maria Vittoria e ritirare i buoni presso gli uffici dell'economato di via Medail. Il buono pasto dovrà essere consegnato presso il locale mensa il giorno precedente. 2-Portare il pasto da casa ed usufruire del locale mensa con la possibilità di riscaldare il pasto nel forno a microonde presente nel locale. (come da regolamento aziendale non si può accedere in divisa) Accesso a internet in qualsiasi momento del suo tirocinio attraverso le credenziali dell' infermiere affiancatore.</p>
<p><b>Contatti e riferimenti</b></p>	<p>Indirizzo via Cibrario, 72 Torino Telefono 0114393391/397 Fax 011439334 e-mail</p>
<p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Mezzi pubblici: 9 - 13 - 16 - 71</p>



## Allegato 1

### Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche

Disabilità, malattie ad alto grado di tutela

Malattie Cardiovascolari

Sindrome coronarica acuta (STEMI,NSTEMI e angina instabile), scompenso cardiocircolatorio con eventuale stimolazione biventricolare, pericardite e miocardite, endocardite valvolare, malattie della conduzione atrio-ventricolare con impianto di pace-maker e/o di defibrillatore definitivo,cardiopatie congenite.

Malattie Cerebrovascolari

Malattie Endocrinologiche, metaboliche

Malattie Intestinali / digestive

Malattie Infettive



**Malattie Nefrologiche, genito/urinarie**

**Malattie Neuromuscolari**

**Malattie Oncologiche**

**Malattie Osteoarticolari**

**Malattie Rare**

**Malattie Respiratorie**

**Malattie Traumatologiche / incidenti**

**Salute degli Immigrati/immigrate**



**Salute in area Materno / infantile**



**Salute Mentale**



**Altro (specificare)**





## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

**Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse**  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

#### Allattamento al seno, inefficace, interrotto

Fattori correlati

##### Fisiologici

Difficoltà del neonato ad attaccarsi al seno o succhiare il latte secondario a :

- Retrazione dei capezzoli, inadeguato riflesso di eiezione del latte, stress
- Labio-palatoschisi
- Prematurità
- Pregresso intervento chirurgico al seno

##### Situazionali

- Fatigue, ansia, ambivalenza della madre
- Parto multiplo
- Inadeguata assunzione di nutrienti/liquidi
- Allattamento insoddisfacente
- Insufficiente sostegno di partner/familiari
- Insufficienti conoscenze
- Interruzione dell'allattamento per malattia della madre o del lattante
- Necessità di svezzare rapidamente il neonato
- Orario di lavoro e/o ostacoli nell'ambiente di lavoro
- Controindicazioni all'allattamento materno (es. farmaci, ittero da latte materno)

#### Alimentazione del bambino, inefficace modello di (dalla nascita ai 9 mesi)

Fattori correlati

##### Fisiopatologici

Aumento del fabbisogno calorico secondario a:

- Instabilità della temperatura corporea
- Tachipnea con aumento dello sforzo respiratorio
- Infezione
- Labioschisi e/o palatoschisi
- Sviluppo fisico
- Cicatrizzazione di ferite
- Scompenso o malattia degli organi vitali

Debolezza/ipotonia muscolare secondaria a

- Malnutrizione
- Prematurità
- Malattia acuta/cronica
- Letargia
- Difetti congeniti
- Scompenso o malattia di organi vitali
- Ritardo/compromissione neurologica
- Iperbilirubinemia

##### Trattamenti

- Stato ipermetabolico (intervento chirurgico, procedure dolorose)
- Debolezza muscolare (farmaci, deprivazione del sonno)
- Ipersensibilità orale



- Precedente digiuno prolungato

**Situazionali**

- Incongruenze fra i caregiver (che provvedono all'alimentazione)
- Mancanza di conoscenze o di impegno da parte dei caregiver in rapporto a regime dietetico o a bisogni alimentari
- Presenza di stimoli orali o facciali nocivi e/o assenza di stimoli orali
- Inadeguata produzione di latte materno

**Ansia**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza**

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)
- Perdita reale o percepita di persone significative
- Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)**
- Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)**
- Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)

**Fasi di sviluppo**

- Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto
- Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei
- Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio
- Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento**

**Aspirazione, rischio di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Riduzione del livello di coscienza ( per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)
- Depressione dei riflessi della tosse/faringeo
- Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)
- Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)
- Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)
- Fistola tracheo-esofagea
- Compromissione dei riflessi protettivi ( chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)

**Trattamenti**

- Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)
- Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo
- Assunzione di alimenti in corso di intossicazione

**Fasi di sviluppo**

- Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione
- Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore
- Persona anziana: dentizione inadeguata



Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Interruzione del processo di attaccamento per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Malattia del genitore/ del bambino</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <p>Barriere all'attaccamento secondarie a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mancanza di riservatezza</li> <li><input type="checkbox"/> Apparecchiature, monitoraggio intensivo</li> <li><input type="checkbox"/> Limitazione dei visitatori, visite rigidamente strutturate</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche (nei confronti del bambino, di se stessi)</li> <li><input type="checkbox"/> Gravidanza indesiderata</li> <li><input type="checkbox"/> Delusione nei confronti del bambino ( es. per il sesso, per l'aspetto)</li> <li><input type="checkbox"/> Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, abuso di sostanze, difficoltà economiche, malattia mentale)</li> <li><input type="checkbox"/> Scarsa conoscenza e/o disponibilità dei modelli di ruolo genitoriale</li> <li><input type="checkbox"/> Disabilità fisica del genitore (es. cecità, paralisi, sordità)</li> <li><input type="checkbox"/> Inadeguata preparazione emotiva dovuta a nascita prematura del bambino</li> </ul>	

Attività, intolleranza all'attività	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p><b>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</li> <li><input type="checkbox"/> Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopulmonare)</li> <li><input type="checkbox"/> Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</li> </ul> <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</li> <li><input type="checkbox"/> Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)</li> <li><input type="checkbox"/> Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</b></li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Inattività</b> (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, <b>insufficiente conoscenza</b>)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Aumento del fabbisogno metabolico</b> (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</b></li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</b></li> </ul>	

Autolesionismo, automutilazione, rischio di	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale)</li> </ul> <p><b>Personali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pregressi episodi di autolesionismo</li> <li><input type="checkbox"/> Abusi fisici, psichici, o sessuali</li> <li><input type="checkbox"/> Inefficaci capacità di coping</li> </ul>	





- Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti
- Fasi di sviluppo**
- Bambino/adolescente: correlati all'abuso

**Autostima, Disturbo/Rischio di**

- Fattori correlati
- Fisiopatologici**
- Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)
  - Deturpazione
  - Squilibri biochimici, neurofisiologici
- Situazionali (personali, ambientali)**
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
  - Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)
  - Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)
  - Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità
  - Insuccesso scolastico
  - Relazione inefficace con i propri genitori
  - Relazioni abusive
  - Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli
  - Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione
  - Storia di numerosi insuccessi
- Fasi di sviluppo**
- Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone
  - Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi)
  - Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative
  - Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento
  - Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento

**Avvelenamento, rischio**

Vedere lesione, rischio

**Cadute, rischio**

Vedere lesione, rischio

**Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di**

- Fattori correlati
- Fisiopatologici**
- Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)
- Trattamenti**
- Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore** o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)
- Situazionali (personali, ambientali)**
- Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver
  - Modello di coping inefficace**
  - Salute fisica compromessa**
  - Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
  - Durata dell'assistenza richiesta
  - Isolamento
  - Pause di riposo/svago insufficienti o



- Risorse economiche insufficienti
- Assenza o non disponibilità di sostegno

**Fasi di sviluppo**

- Esigenza di assistenza continua secondaria a** disabilità mentali (specificare) o **disabilità fisiche (immobilità prolungata nelle 24h dovuta ad indagini diagnostico-terapeutiche)**

**Casa, compromessa gestione**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.
- Mancata disponibilità di un sistema di sostegno
- Perdita di un familiare
- Deficit di conoscenze
- Insufficienza di risorse economiche

**Fasi di sviluppo**

- Bambino (correlata all'esigenza di cure molteplici)
- Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)

**Comunicazione, compromissione e  
Comunicazione verbale, compromissione**



(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia
- Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio
- Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.
- Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)
- Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)

**Trattamenti**

- Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)
- Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- Mancanza di riservatezza
- Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

**Fasi di sviluppo**

- Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale)
- Persona anziana (perdite uditive)
- Compromissione cognitiva per (specificare patologia)



<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Variazioni</b> dell'aspetto, <b>dello stile di vita</b>, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Immobilità o perdita di funzioni, percezione di perdita della salute e dipendenza dal pacemaker</b></li> <li><input type="checkbox"/> Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li> <li><input type="checkbox"/> Preferenze sessuali</li> <li><input type="checkbox"/> Gravidanza nel corso dell'adolescenza</li> <li><input type="checkbox"/> Differenza di sesso nell'educazione dei figli</li> <li><input type="checkbox"/> Esperienze di violenza da parte dei genitori</li> <li><input type="checkbox"/> Cambiamento del consueto modello di responsabilità</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</b></li> </ul>	

<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fattori di rischio</b></p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)</b></li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico</b>, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, <b>effetti collaterali dei farmaci</b> (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci <b>come diuretici, digitale, propanololo</b>, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenintoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Dolore, fecaloma, immobilità,</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Depressione, situazioni non familiari</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)</b></li> </ul>	

<b>Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)</b>	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Presenza di batteri, virus, tossine</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Stati patologici pre-esistenti</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Genere</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Storia di fumo</b></li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p>	



- Vaccinazioni recenti
- Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione
- Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati
- Situazionali (personali, ambientali)**
  - Alluvioni, terremoti, disastri naturali.
  - Perdite rete fognaria
  - Emissioni da impianti industriali:scarichi intenzionali o accidentali di contaminanti da locali commerciali o industriali, inquinamento delle falde acquifere
  - Fattori fisici:condizioni climatiche, area geografica
  - Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria
  - Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori)
  - Bioterrorismo
  - Tipo di lavoro
  - Pratiche dietetiche
  - Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche
  - Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni
- Fasi di sviluppo**
  - Caratteristiche evolutive dei bambini
  - Bambini di età inferiore a 5 anni
  - Persone anziane
  - Età gestazionale durante l'esposizione

### Coping inadeguato della famiglia

Fattori correlati

#### **Biofisiopatologici**

- Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

#### **Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)
- Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli
- Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori
- Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli

### Coping inefficace

Fattori correlati

#### **Fisiopatologici**

- Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

#### **Trattamenti**

- Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

#### **Situazionali (personali, ambientali)**

- Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- Disorganizzazione del sistema familiare
- Inefficace capacità di problem solving
- Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress
- Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco,povertà, disastro naturale)
- Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)



- Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale ( ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

**Fasi di sviluppo**

- Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

**Cura di sé, deficit (alimentazione)**

**Incapacità di (specificare):**

- tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- portare il cibo alla bocca



**Fattori correlati**

**Fisiopatologici**

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Deficit cognitivi
- Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- Confusione mentale
- Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

**Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)**

**Ridotta e/o incapacità di (specificare):**

- lavare il proprio corpo o parti**





- procurarsi l'acqua**
- regolare la temperatura o il flusso dell'acqua**
- percepire il bisogno di cure igieniche**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori**

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Deficit cognitivi**
- Dolore**
- Scarsa motivazione**
- Affaticamento**
- Confusione mentale**
- Ansia che paralizza**

**Fasi di sviluppo**

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare**

**Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)**

Ridotta e/o incapacità di (specificare):

- mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti**
- curare il proprio aspetto**
- acquistare o cambiare capi di vestiario**
- o il flusso dell'acqua**
- percepire il bisogno di cure igieniche**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori**

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Deficit cognitivi**
- Dolore**
- Scarsa motivazione**
- Affaticamento**
- Confusione mentale**



<input type="checkbox"/> <b>Ansia che paralizza</b> <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> <b>Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</b>
---

<b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b> <b>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</b> <input type="checkbox"/> <b>servirsi del gabinetto/comoda</b> <input type="checkbox"/> <b>trasferirsi sul gabinetto/comoda</b> <input type="checkbox"/> <b>eseguire pratiche igieniche adeguate</b> <input type="checkbox"/> <b>pulire il gabinetto o la comoda</b> <input type="checkbox"/> <b>sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</b>	<b>X</b>
---	----------

<b>Fattori correlati</b> <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <b>Trattamenti</b> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> <b>Affaticamento e dolore post operatori</b> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input type="checkbox"/> <b>Deficit cognitivi</b> <input type="checkbox"/> <b>Dolore</b> <input type="checkbox"/> <b>Scarsa motivazione</b> <input type="checkbox"/> <b>Affaticamento</b> <input type="checkbox"/> <b>Confusione mentale</b> <input type="checkbox"/> <b>Ansia che paralizza</b> <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> <b>Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</b>
---

<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b> <b>Difficoltà a (specificare)</b> <input type="checkbox"/> <b>usare il telefono</b> <input type="checkbox"/> <b>accedere ai mezzi di trasporto</b> <input type="checkbox"/> <b>lavare e stirare</b> <input type="checkbox"/> <b>preparare i pasti</b> <input type="checkbox"/> <b>fare la spesa</b> <input type="checkbox"/> <b>gestire il denaro</b> <input type="checkbox"/> <b>assumere i farmaci</b>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

<b>Fattori correlati</b> <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici
--





- Deficit somatiformi

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Deficit cognitivi
- Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- Confusione mentale
- Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

**Deambulazione, compromissione, rischio**

Vedere mobilità, compromissione, rischio



**Deglutizione, compromissione**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)
- Tumore / edema tracheo-esofageo
- Irritazione della cavità orofaringea
- Diminuzione della salivazione

**Trattamenti**

- Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso
- Riduzione della coscienza per anestesia
- Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica
- Esofagite da radioterapia

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Alterazione del livello di coscienza
- Fatigue

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione
- Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto

**Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

**Trattamenti**

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini)





<p><b>diagnostiche/venipuntura/biopsia</b>, scansionometria invasiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Febbre</li> <li><input type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li><input type="checkbox"/> Iperattività</li> <li><input type="checkbox"/> Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li><input type="checkbox"/> Risposta allergica</li> <li><input type="checkbox"/> Irritanti chimici</li> <li><input type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Ansia grave e repressa</b></li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 anno: coliche</li> <li><input type="checkbox"/> Prima infanzia: dentizione, otalgia</li> <li><input type="checkbox"/> Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita</li> <li><input type="checkbox"/> Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.</li> </ul>	
--	--

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	<b>X</b>
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Disordini viscerali (cardiaci, renali</b>, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li><input type="checkbox"/> Cancro</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</b></li> <li><input type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li><input type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)</li> <li><input type="checkbox"/> Effetti di un tumore su (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> <li><input type="checkbox"/> Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> <li><input type="checkbox"/> Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansionometria invasiva)</li> <li><input type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Febbre</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Immobilità/posizionamento inappropriato</b></li> <li><input type="checkbox"/> Iperattività</li> <li><input type="checkbox"/> Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li><input type="checkbox"/> Risposta allergica</li> <li><input type="checkbox"/> Irritanti chimici</li> <li><input type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li><input type="checkbox"/> Ansia grave e repressa</li> </ul>	
--	--

<b>Eliminazione urinaria compromessa</b>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

<p><b>Per Incontinenza urinaria (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</b></li> </ul> <p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie</li> <li><input type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite,</li> </ul>	
--	--



trauma)

- Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

**Trattamenti**

- Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)

**Eminegligenza**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale

**Fatigue**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)
- **Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)**
- Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)
- Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS)
- Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore
- Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)
- Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)

**Trattamenti**

- Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,
- **Aumento del consumo energetico** (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- **Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)**
- Eccessive richieste di ruolo
- Richieste emozionali sovraccarichi
- Stress emotivo
- Disturbi del sonno

**Immagine corporea, Disturbo/Rischio di**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento

**Trattamenti**

- variazione dell'aspetto ( per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)
- Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)

**Immobilizzazione, sindrome da**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Riduzione del sensorio
- Stato di incoscienza
- Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)
- Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)
- Malattia terminale** (AIDS, **cardiopatìa**, nefropatia)
- Cancro

Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)

**Trattamenti**

- Intervento chirurgico**
- Ventilazione meccanica
- Linee venose**
- Trazione/gesso/tutore ortopedico
- Immobilità prescritta**

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Depressione
- Fatigue**
- Stato di debilitazione
- Dolore**

**Fasi di sviluppo**

- Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida
- Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile**

**Incontinenza fecale**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione dello sfintere rettale ( per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)
- Compromissione delle funzioni cognitive
- Iperdistensione rettale per stipsi cronica
- Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)
- Trattamenti
- Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

**Incontinenza urinaria da sforzo**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale
- Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: perdita di tono muscolare

**Incontinenza urinaria da urgenza**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma,



uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo

**Trattamenti**

- Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale,
- Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi
- Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: limitata capacità vescicale
- Persona anziana: diminuita capacità vescicale

**Incontinenza urinaria funzionale**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva

**Trattamenti**

- Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorellassanti

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione della mobilità
- Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

**Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria
- Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

**Trattamenti**

- Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- Strumentazione diagnostica
- Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorellassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione della mobilità
- Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

**Infezione, rischio di**





Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)
- **Compromissione della circolazione per** linfedema, obesità, **malattia vascolare periferica**

**Trattamenti**

- **Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico**, intubazione, **linee invasive**, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale
- Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- **Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress**, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità
- Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio
- gessato, pieghe cutanee)
- **Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)**

**Fasi di sviluppo**

- Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circonscisione), sistema immunitario immaturo
- Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali
- **Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)**

**Insonnia**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)
- Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)
- Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)
- Eccessivo dormire di giorno
- Depressione
- Inadeguata attività fisica durante il giorno
- Dolore cronico
- Risposte ansiose
- Modifiche ambientali (specificare)
- Paura
- Frequenti risvegli dei bambini
- Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)

**Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia, .



<b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

- Fattori correlati
- Inadeguata igiene orale
  - Incapacità di provvedere all'igiene orale

<b>Ipertermia</b>	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

- Fattori correlati
- Trattamenti**
- Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)
- Situazionali**
- Esposizione al calore, al sole
  - Abbigliamento inadeguato al clima
  - Assenza di condizionamento dell'aria
  - Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero
  - Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)
  - Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa
- Fasi di sviluppo**
- Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età

<b>Ipotermia</b>	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

- Fattori correlati
- Situazionali (personali, ambientali)**
- Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento
  - Vestiario inadatto al clima
  - Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento
  - Diminuzione della circolazione ( per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)
- Fasi di sviluppo**
- Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)

<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
----------------------------	----------

- Fattori correlati
- Fisiopatologici**
- Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)
  - Alterazioni della mobilità** (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
  - Fatigue
  - Ipotensione ortostatica
  - Insufficienza vertebro basilare
  - Disturbi vestibolari
  - Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)
  - Movimenti tonico-clonici (convulsioni)
- Trattamenti**
- Lungo allettamento**
  - Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)
  - Gesso, stampelle, deambulatore, bastone
- Situazionali (personali, ambientali)**
- Diminuzione o perdita memoria a breve termine
  - Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
  - Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)
  - Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)
  - Pericolo di incendio



- Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- Scarpe inadatte,
- Disattenzione del caregiver
- Uso improprio degli ausili
- Storia di incidenti
- Andatura instabile

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli
- Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

**Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione)
- Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi)
- Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento
- Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite)

**Trattamenti**

- Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia
- Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore
- Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano)

**Fasi di sviluppo**

- Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata)

**Liquidi, eccessivo volume di**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- Iperensione portale, diminuzione della pressione colloido-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

**Trattamenti**

- Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea)
- Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- Ristagno venoso declive/venostasi ( per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)
- Compromissione venosa da utero gravido

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

**Liquidi, insufficiente volume di**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**





- Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Vomito/nausea
- Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- Dieta scorretta/digiuno
- Nutrizione per sonda con soluzione concentrata
- Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
- Esposizione a climi estremi
- Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
- Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

**Memoria, compromissione**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
- Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
- Deficienze nutrizionali

**Trattamenti**

- Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Aspettative che si auto realizzano
- Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- Consumo di alcol
- Mancanza di motivazione
- Inadeguata stimolazione
- Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)

**Mobilità, compromissione /rischio di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- edemi
- apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)
- forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- fatigue





- obesità
- mancanza di motivazione
- dispnea
- dolore

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite
- Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

**Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio**  
Vedere mobilità, compromissione, rischio



**Nausea**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)

**Trattamenti**

- Effetti della chemioterapia e/o farmaci
- Effetti dell'anestesia

**Non adesione (a indicazioni terapeutiche)**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)
- Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato

**Trattamenti**

- Effetti collaterali della terapia
- Ambiente non terapeutico
- Terapia complessa non controllata/prolungata
- Costo economico della terapia
- Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace
- Processo di presa in carico impersonale (multi professionale)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)
- Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- Modificazione dello stato lavorativo
- Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie
- Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

**Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione,



trauma,complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)

- Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)
- Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)
- Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo

**Trattamenti**

- Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- Diarrea

**Fasi di sviluppo**

- Neonato/bambino: inadeguat assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)
- Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza la lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi , labioschisi, palatoschisi)
- Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)

**Nutrizione superiore al fabbisogno**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Alterato modello di sazietà (specificare)
- Riduzione dei sensi di gusto/olfatto

**Trattamenti**

- Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Rischio di aumento ponderale in gravidanza superiore a 12/13 Kg
- Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali

**Fasi di sviluppo**

- Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico

**Respirazione, inefficace funzionalità, rischio**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)
- Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)

**Trattamenti**

- Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)
- Soppressione del riflesso della tosse



- Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)
- Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)

**Soffocamento, rischio**

**Vedere rischio di lesione**



**Stipsi**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)
- Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)
- Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)
- Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)
- Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare
- Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile
- Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)

**Trattamenti**

- Effetti collaterali di farmaci (specificare)
- Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica
- Uso abituale di lassativi
- Mucosite secondaria a radiazioni

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
- Modello di evacuazione irregolare
- Credenze culturali/sulla salute
- Mancanza di riservatezza
- Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
- Paura di dolore rettale o cardiaco
- Valutazioni errate
- Incapacità di percepire i segnali intestinali

**Stress, sovraccarico psicofisico**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)
- Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra
- Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)
- Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali
- Perdite funzionali

**Trasloco, stress da**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di



salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Risorse economiche insufficienti
- Elevati livelli di cambiamenti ( per ammissione in strutture residenziali/di assistenza)
- Perdita di legami sociali/familiari
- Abbandono
- Modifica delle relazioni familiari
- Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento

**Fasi di sviluppo**

- Bambino/adolescente: perdite associate al trasloco (paura di sentirsi rifiutato; perdita degli amici, problemi scolastici), insicurezze legate all'inserimento nel nuovo ambiente (nuovo gruppo, nuova scuola)
- Persona anziana: necessità della vicinanza dei familiari per l'assistenza, ammissione in struttura di assistenza

**Trasferimento, compromissione, rischio**

Vedere mobilità, compromissione, rischio



**Trauma, rischio**

Vedere rischio di lesione





**Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Disturbi del modello del sonno, correlato a dispnea notturna e incapacità di assumere la posizione abituale per dormire.



### Allegato 3

<b>PROBLEMI COLLABORATIVI <u>PRELEVALEMENTE</u> TRATTATI</b>	
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)	
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	□
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	□
RC per crisi falciforme	□
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X



<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per ipertensione endocranica	<input type="checkbox"/>
RC per crisi convulsiva	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione intraoculare	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome neurolettica maligna	<input type="checkbox"/>
RC per astinenza da alcol	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per ileo paralitico	<input type="checkbox"/>
RC per sanguinamento gastrointestinale	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per disfunzione epatica	<input type="checkbox"/>
RC per iperbilirubinemia	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica</b>	
RC per fratture patologiche	<input type="checkbox"/>
RC per lussazione	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione riproduttiva</b>	
RC per sanguinamento genitale pretravaglio	<input type="checkbox"/>
RC per parto pretermine	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione gestazionale	<input type="checkbox"/>
RC per condizioni del feto non rassicuranti	<input type="checkbox"/>
RC per emorragia postpartum	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	<input checked="" type="checkbox"/>



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.**

**Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

Il percorso di apprendimento clinico mette lo studente nelle condizioni di rapportarsi con i seguenti **problemi di salute prevalenti**:

- ▲ cardiopatia ischemica
- ▲ scompenso cardiaco
- ▲ turbe del ritmo con impianto di pacemaker
- ▲ pericardite/miopericardite
- ▲ endocardite valvolare

Il **modello assistenziale** usato è per piccola équipe. Vi sono due équipe, ognuna è formata da un medico, un infermiere ed un operatore socio sanitario e si occupa dell'assistenza di metà delle persone presenti nel servizio.

#### **Lo studente con la supervisione del tutor e/o dell'infermiere guida:**

- accoglie la persona assistita proveniente dal Pronto Soccorso, dall'UTIC, dal Day Hospital, dal domicilio o da altre unità operative e le persone di riferimento (caregiver) presentando loro la struttura, il personale, le procedure tecnico assistenziali eseguite e le motivazioni, consegnando il libretto informativo del reparto
- raccoglie l'anamnesi infermieristica, registrando in cartella integrata, in parte cartacea in parte informatizzata, i dati relativi all'identificazione della persona e della sua situazione socio-familiare, alle sue abitudini di vita e agli elementi della sua storia clinica correlati ai problemi di salute, alle capacità di collaborazione e alle risorse attivabili dalla persona e dai suoi familiari
- identifica i problemi/bisogni assistenziali infermieristici della persona assistita, utilizzando, se necessario, opportune scale di valutazione ( ADL, CONLEY, VAS, BRADEN ) e pianifica gli interventi assistenziali sulla base delle priorità, valutando il motivo dell'ingresso (diagnosi medica), i sintomi (dolore, affaticamento, dispnea), i parametri vitali (PAO, FC, SPO2, TC), l'elettrocardiogramma all'ingresso, la coagulazione, la funzionalità renale, gli indici di flogosi
- definisce gli obiettivi di assistenza e applica interventi tecnici, relazionali ed educativi finalizzati al percorso diagnostico-terapeutico facendo riferimento ai protocolli aziendali
- esegue correttamente un elettrocardiogramma e conosce le basi fisiopatologiche per approcciarsi in modo sistemico alla lettura (individuare un ritmo sinusale, riconoscere i disturbi della conduzione, valutare il tratto ST ...)



- somministra la terapia farmacologica, tra cui anticoagulanti, trombolitici, antiaritmici, antipertensivi, antibiotici e conosce la loro modalità di preparazione, assunzione e possibili effetti indesiderati
- prepara la persona assistita sottoposta a coronarografia/angioplastica e/o impianto di pacemaker, occupandosi di:
  - trattamento della cute
  - tricotomia
  - alimentazione
  - consensi informati
  - mobilitazione
  - rilevazione dei parametri vitali
  - reperimento dell'accesso venoso periferico
  - controllo del sito di inserzione dell'accesso arterioso (radiale o femorale) e dei polsi periferici
  - applicazione del protocollo desensibilizzante in caso di allergia
  - applicazione del protocollo per l'idratazione in caso di insufficienza renale
  - medicazione della ferita chirurgica
- supporta la persona assistita e allevia l'eventuale disagio
- monitorizza, dopo l'esecuzione della coronarografia/angioplastica, le condizioni cliniche della persona assistita e i parametri concordati con l'equipe infermieristica: coagulazione, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, dolore retrosternale, respiro, saturimetria
- riconosce e segnala nella fase post-coronarografia/angioplastica, impianto di pacemaker eventuali alterazioni di: stato di coscienza, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, ritmo, respiro, temperatura
- esegue ed interpreta eventuali esami ematochimici di controllo (curva enzimatica, elettroliti, esami della coagulazione)
- registra nella documentazione infermieristica, compilando le check-list, l'assistenza erogata con relativa valutazione degli interventi espletati
- collabora con il medico nella fase di dimissione, creando un progetto educativo personalizzato che vada ad insegnare alla persona assistita e/o al suo care giver:
  - i segni e i sintomi di riacutizzazione della malattia (edemi declivi, dispnea, angina, febbre, incremento del peso corporeo, vertigini nel cambio di postura)
  - l'assunzione della terapia farmacologica ed i rispettivi effetti indesiderati, ricordando l'importanza di non sospendere autonomamente la terapia
  - l'importanza dei controlli di follow-up
  - l'importanza di seguire una dieta e un'attività fisica adeguate correlate alla patologia.



Per gli studenti del 2° e del 3° anno è inoltre possibile costruire un percorso di apprendimento in relazione al **percorso assistenziale della persona assistita**. L'esperienza può essere progettata nei seguenti percorsi assistenziali:

- PDTA – Cardiopatia ischemica (servizi coinvolti: Cardiologia, Emodinamica, Ambulatori di diagnostica non invasiva, Day Surgery, UTIC)
- PDTA – Scompenso cardiaco (servizi coinvolti: Cardiologia, Ambulatorio-Day Hospital per lo scompenso cardiaco, Ambulatorio di elettrofisiologia e sala pacemaker, Ambulatorio infermieristico territoriale per lo scompenso cardiaco).

(Per gli obiettivi formativi specifici e le attività si rimanda al progetto specifico "Percorso di apprendimento clinico assistenziale in ambito cardiologico presso il p.o. Maria Vittoria - ASLTO2)