



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome Annamaria Cognome Leonte Telefono 0114395230 e-mail annamaria.leonte@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	S.S. Cure – Assistenza Domiciliare, Distretto 1 Circ. 4 Via Asinari di Bernezzo, 78 Torino Orario: 8.00-20.00 Infermieri, coordinatore infermieristico PC Non è presente il locale per il consumo del pasto.
Contatti e riferimenti	Tel. 0114395230 FAX 0114395244 e-mail Adi.pacchiotti@aslto2.piemonte.it
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	Autobus n. 65 e n. 71 Metropolitana fermata "Bernini"



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cardiovascolari X

Cardiopatie, vasculopatie, ipertensione

Malattie Cerebrovascolari X

Ictus, demenze, morbo di Parkinson

Malattie Endocrinologiche, metaboliche X

Diabete mellito

Malattie Intestinali / digestive X

neoplasie

Malattie Nefrologiche, genito/urinarie X

Insufficienze renali, neoplasie

Malattie Neuromuscolari X

Neuropatie, sclerosi laterale amiotrofica, distrofie

Malattie Oncologiche X

K gastrico, mammella, colon-retto, polmonare, cerebrale



Malattie Osteoarticolari	X
Artrosi, artropatie	
Malattie Respiratorie	X
BPCO, tumori, insufficienza respiratoria	
Malattie Traumatologiche / incidenti	X
Fissatori esterni	



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Perdita reale o percepita di persone significative</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</p>	
Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)</p> <p>Trattamenti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X xPersona anziana: dentizione inadeguata</p>	
Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispasia)</p>	



<p>broncopolmonare)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</p> <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</p> <p>Trattamenti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario,insufficiente conoscenza)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</p>
--

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Squilibri biochimici, neurofisiologici</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</p>	
Cadute, rischio	X
Vedere lesione, rischio	

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</p> <p>Trattamenti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X Modello di coping inefficace</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> x Salute fisica compromessa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> x Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> x Durata dell'assistenza richiesta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> x Isolamento</p>	



- x** Pause di riposo/svago insufficienti o
- x** Risorse economiche insufficienti
- x** Assenza o non disponibilità di sostegno

Fasi di sviluppo

- x** Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)

Casa, compromessa gestione

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- x** Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare)

Situazionali (personali, ambientali)

- x** Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.
- X** Mancata disponibilità di un sistema di sostegno
- X** Perdita di un familiare
- X** Deficit di conoscenze
- X** Insufficienza di risorse economiche

Fasi di sviluppo

- X** Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)

**Comunicazione, compromissione e
Comunicazione verbale, compromissione**

X

(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X** Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio
- X** Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.
- X** Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)
- X** Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- X** Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)

Trattamenti

- X** Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)

Situazionali (personali, ambientali)

- X** Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)

Fasi di sviluppo

- X** Persona anziana (perdite uditive)
- X** Compromissione cognitiva per (specificare patologia)



Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Immobilità o perdita di funzioni <input checked="" type="checkbox"/> X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità) 	
Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia) <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio) <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale) <input checked="" type="checkbox"/> X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) <input checked="" type="checkbox"/> X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) <input checked="" type="checkbox"/> X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale) <input checked="" type="checkbox"/> X Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi) <p>Trattamenti</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore, fecaloma, immobilità, <input checked="" type="checkbox"/> X Depressione, situazioni non familiari 	
Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Presenza di batteri, virus, tossine <input checked="" type="checkbox"/> X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali) <input checked="" type="checkbox"/> X Stati patologici pre-esistenti <p>Trattamenti</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persone anziane 	
Coping inadeguato della famiglia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica 	



Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) <input type="checkbox"/> X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale) <input type="checkbox"/> X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione) <input type="checkbox"/> X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver <input type="checkbox"/> X Disorganizzazione del sistema familiare <input type="checkbox"/> X Inefficace capacità di problem solving <input type="checkbox"/> X adozione/affidamento) <input type="checkbox"/> X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani. <input type="checkbox"/> X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche 	

Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
<p>Incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni <input type="checkbox"/> X portare il cibo alla bocca 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> X Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> X Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> X Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> X Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> X Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> X Stato comatoso <input type="checkbox"/> X Disturbi visivi <input type="checkbox"/> X Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> X Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> X Dolore <input type="checkbox"/> X Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> X Affaticamento <input type="checkbox"/> X Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	



<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> X procurarsi l'acqua <input checked="" type="checkbox"/> X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> X percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> X Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore <input checked="" type="checkbox"/> X Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> X Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> X Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> X curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> X acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> X o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> X percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> X Arti non funzionanti o mancanti <p>Trattamenti</p>	



<input type="checkbox"/> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> X Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> X Dolore <input type="checkbox"/> X Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> X Affaticamento <input type="checkbox"/> X Confusione mentale Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--

Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> X servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> X trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> X eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> X pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto	X
---	----------

Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> X Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit somatici Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore <input checked="" type="checkbox"/> X Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> X Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> X Confusione mentale Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare



Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X usare il telefono <input checked="" type="checkbox"/> X accedere ai mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> X lavare e stirare <input checked="" type="checkbox"/> X preparare i pasti <input checked="" type="checkbox"/> X fare la spesa <input checked="" type="checkbox"/> X gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> X assumere i farmaci 	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> X Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit somatiformi Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore <input checked="" type="checkbox"/> X Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> X Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> X Confusione mentale Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
--	----------

Deglutizione, compromissione	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) <input checked="" type="checkbox"/> X Tumore / edema tracheo-esofageo <input checked="" type="checkbox"/> X Irritazione della cavità orofaringea <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione della salivazione Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica 	



Situazionali (personali, ambientali)

- X Alterazione del livello di coscienza
- X Fatigue

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Cancro
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- X Effetti di un tumore su (specificare)

Trattamenti

- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
-

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Cancro
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- X Effetti di un tumore su (specificare)

Trattamenti

- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato



Eliminazione urinaria compromessa	X
Per Incontinenza urinaria (specificare): <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <input checked="" type="checkbox"/> X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input checked="" type="checkbox"/> X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input checked="" type="checkbox"/> X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	

Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) 	
---	--

Fatigue	X
----------------	----------

Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) <input checked="" type="checkbox"/> X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) <input checked="" type="checkbox"/> X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS) <input checked="" type="checkbox"/> X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore <input checked="" type="checkbox"/> X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) <input checked="" type="checkbox"/> X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia, <input checked="" type="checkbox"/> X Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) <input checked="" type="checkbox"/> X Disturbi del sonno 	
--	--

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
---	----------

Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico) 	
---	--



Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Riduzione del sensorio <input checked="" type="checkbox"/> X Stato di incoscienza <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale) <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche) <input checked="" type="checkbox"/> X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia) <input checked="" type="checkbox"/> X Cancro <p>Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Fatigue <input checked="" type="checkbox"/> X Stato di debilitazione <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile 	
Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica) <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione delle funzioni cognitive <input checked="" type="checkbox"/> X Iperdistensione rettale per stipsi cronica <input checked="" type="checkbox"/> X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive) 	
Incontinenza urinaria da sforzo	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: perdita di tono muscolare 	
Incontinenza urinaria da urgenza	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana:diminuita capacità vescicale 	



Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione della mobilità <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <input type="checkbox"/> X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione della mobilità <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <input type="checkbox"/> X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	



Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie,ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	

Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori,arteriosclerosi periferica) <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria) <input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Eccessivo dormire di giorno <input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguata attività fisica durante il giorno <input checked="" type="checkbox"/> X Dolore cronico <input checked="" type="checkbox"/> X Risposte ansiose <input checked="" type="checkbox"/> X Paura 	

Integrità cutanea/tissutale:compromissione, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia,. 	

Integrità mucosa orale, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Incapacità di provvedere all'igiene orale 	

Ipertermia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali</p>	



- X Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa

Lesione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)
- X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- X Fatigue
- X Ipotensione ortostatica
- X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)

Trattamenti

- X Lungo allettamento
- X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)
- X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- X Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)
- X Disattenzione del caregiver
- X Uso improprio degli ausili
- X Andatura instabile

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

Liquidi, eccessivo volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- X Iperensione portale, diminuzione della pressione colloido-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

- X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare



Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato) <input checked="" type="checkbox"/> X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Vomito/nausea <input checked="" type="checkbox"/> X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) <input checked="" type="checkbox"/> X Dieta scorretta/digiuno <input checked="" type="checkbox"/> X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete 	
Memoria, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico) <input checked="" type="checkbox"/> X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento) <input checked="" type="checkbox"/> X Deficienze nutrizionali <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguata stimolazione <input checked="" type="checkbox"/> X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni) 	
Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) <input checked="" type="checkbox"/> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) <input checked="" type="checkbox"/> X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco) <input checked="" type="checkbox"/> X edemi <input checked="" type="checkbox"/> X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso) <input checked="" type="checkbox"/> X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X fatigue <input checked="" type="checkbox"/> X obesità <input checked="" type="checkbox"/> X mancanza di motivazione <input checked="" type="checkbox"/> X dispnea <input checked="" type="checkbox"/> X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	



Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
--	----------

Nausea	X
Fattori correlati	
Trattamenti	
<input type="checkbox"/> X Effetti della chemioterapia e/o farmaci	

Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)	
<input type="checkbox"/> X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato	
Trattamenti	
<input type="checkbox"/> X Effetti collaterali della terapia	
<input type="checkbox"/> Ambiente non terapeutico	
<input type="checkbox"/> X Terapia complessa non controllata/prolungata	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input type="checkbox"/> X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)	

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)	
<input type="checkbox"/> X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)	
<input type="checkbox"/> X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)	
<input type="checkbox"/> X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)	
Trattamenti	
<input type="checkbox"/> X Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input type="checkbox"/> X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)	
<input type="checkbox"/> X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)	
<input type="checkbox"/> X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)	
<input type="checkbox"/> X Diarrea	

Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)	



- X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)

Trattamenti

- X Soppressione del riflesso della tosse
 X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)

Stipsi

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)
 X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)
 X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)
 X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare

Trattamenti

- X Effetti collaterali di farmaci (specificare)
 X Uso abituale di lassativi

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
 X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
 X Incapacità di percepire i segnali intestinali

Stress, sovraccarico psicofisico

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

Situazionali (personali, ambientali)

- X Perdite funzionali

Trauma, rischio

Vedere rischio di lesione

X



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Il tirocinio presso il servizio di Cure – Assistenza Domiciliare è caratterizzato dalla presa in carico globale dell'assistito di varie fasce d'età, che non può prescindere dalla valutazione del contesto sociale, familiare ed ambientale, con modalità di case management (gestione del caso). Compatibilmente con le possibilità dell'assistito, il progetto assistenziale implica in modo imprescindibile la sua condivisione tra la famiglia e le figure professionali coinvolte. Il conseguente percorso educativo porterà al raggiungimento del migliore grado di autonomia possibile per l'assistito, il caregiver ed il nucleo familiare.

Il tirocinio pone inoltre lo studente nelle condizioni di rivalutare le modalità di applicazione delle conoscenze e capacità già acquisite, dovendole adattare ad un contesto domiciliare, che differisce dall'ambito ospedaliero per alcune caratteristiche: setting, contratto assistenziale, passaggio di competenze tecniche e cognitive al care-giver.

Lo studente è costantemente affiancato da un infermiere nelle attività assistenziali ed organizzative.

La necessità di interfacciarsi con il medico di medicina generale, specialisti territoriali e/o ospedalieri, con operatori dei servizi sociali, allo scopo di creare un progetto multidisciplinare rispondente alle necessità dell'assistito, richiede all'infermiere (che spesso opera solo) la capacità di lavorare creando condivisione e confronto costante.

Lo studente avrà inoltre la possibilità di conoscere ed utilizzare la cartella integrata, documento che compilano le varie figure professionali coinvolte nel progetto assistenziale.

Un'altra opportunità offerta allo studente che svolge il proprio tirocinio c/o il nostro servizio, è quella di poter partecipare una volta al mese agli incontri che si svolgono con l'équipe delle Cure Palliative per affrontare i casi che si condividono.

Si segnala inoltre la presenza di protocolli aziendali e/o interni utilizzati dal servizio.