

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

CONTESTO				
ASL /ASO /altro (specificare)	ASL TO2			
Denominazione struttura/servizio	S.S Assistenza Domiciliare Specialistica S.S. Cure Palliative			
Contesto di apprendimento (struttura sanitaria/domicilio/comunità): breve descrizione	Il setting privilegiato è il domicilio della persona assistita. Collaborazione con Cure Domiciliari Circ. IV e V Case Famiglia			
Sede, indirizzo	p.o. Amedeo di Savoia – Pad Umberto I - stanza 1- 5-7 - C.so Svizzera, 164			
Recapiti: telefono, fax, e-mail	Tel/Fax 011/4393872 Tel 011/4393855 - 011/4393796			
Tutor clinico	Luisa lanniello			
Recapiti tutor clinico (telefono, e-mail)	011/4393855 - 011/4393796 luisa.ianniello@unito.it			

PROBLEMI DI SALUTE PREVALENTEMENTE TRATTATI					
Salute Materno Infantile		Malattie Oncologiche	Х		
Incidenti		Malattie Renali e/o Urinarie			
Malattie Cardiovascolari		Malattie Respiratorie			
Malattie Cerebrovascolari		Salute degli Anziani			
Malattie Diabetiche		Salute Mentale			
Malattie Gastroenterologiche		Patologia delle Dipendenze			
Malattie trasmissibili	X	Altro (specificare)			
Disabilità					





Indicare, tra quelle in elenco, le diagnosi infermieristiche <u>prevalenti</u> trattate nel servizio (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

		agaigana	
DIAGNOSI INFERMIERISTICHE		ossigeno Autolesionismo, rischio di	` ` `
Allattamento al seno, inefficace, interrotto		Correlato a:	X
Correlato a difficoltà del neonato ad attaccarsi	Ш	☐ X disabilità, malattia terminale, cronica	
al seno o succhiare il latte secondaria a :		□ X dolore cronico	
□ Retrazione dei capezzoli		☐ X dipendenza da sostanze	
□ Labio-palatoschisi		☐ X compromissione mentale, disturbi	
□ Prematurità		psichiatrici, della personalità	
□ Correlato a situazioni personali o		Automutilazione, rischio di	X
ambientali:		Correlato a rischio di autolesionismo	^
□ Ansia della madre		Autostima, Disturbo/Rischio di	Χ
□ Insufficienti conoscenze		(percezione della propria competenza e	^
□ Insufficiente sostegno del partner/familiari		dell'apprezzamento da parte degli altri)	
Alimentazione del bambino, inefficace		Correlato a:	
Correlato ad aumento del fabbisogno calorico		□ X bisogno di dipendenza,	
secondario a:		□ X senso di abbandono,	
□ Instabilità della temperatura corporea		☐ Xsenso di fallimento	
□ Infezione		Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
□ Labioschisi		Correlata a:	
□ Correlato a debolezza/ipotonia muscolare secondaria a malnutrizione		□ X assistenza continua e complessa legata a condizioni fisiopatologiche (demenza, tossicodipendenza)	
□ Prematurità Ansia		□ X responsabilità assistenziali legate a	
Correlata a:	X	trattamenti (dialisi)	
□ X minaccia reale o percepita al concetto di		Comunicazione, compromissione	Χ
sé (fallimento, modificazione dello status,		Correlata a:	^
mancato riconoscimento da parte degli		□ X effetti di un deficit uditivo	
altri)		□ X effetti dell'afasia	
□ X perdita reale o percepita di persone		□ X barriera rappresentata da lingua straniera	
significative		Comunicazione verbale, compromissione	Χ
□ X minaccia reale o percepita all'integrità biologica (malattia, violenza)		(incapacità a pronunciare le parole) Confusione mentale acuta	
□ X cambiamento ambientale reale o		Correlata a:	X
percepito (trasloco, ospedalizzazione,		□ X squlibri idroelettrolitici,	
pensionamento, condizione di rifugiato)		□ X deficit nutrizionali,	
□ X cambiamento reale o percepito delle		X disturbi cardiovascolari/respiratori,	
condizioni socioeconomiche			
(disoccupazione, cambiamento di lavoro,			
licenziamento, promozione)		□ X trattamenti (farmaci, intervento chirurgico)	
Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di		□ X situazioni personali o ambientali (alcool,	
Correlato a:		intossicazioni chimiche)	
□ malattia del genitore/ del bambino		Confusione mentale cronica	X
□ mancanza di riservatezza		Correlata a:	
- Particular delication		□ X meccanismi fisiopatologici con	
		degenerazione progressiva della corteccia	
☐ difficoltà delle relazioni		cerebrale (m: Alzheimer, demenza senile, malattia multi-infartuale)	
□ difficoltà economiche		,	
□ abuso di sostanze		☐ X disturbi del metabolismo, della struttura o dell'integrità cerebrale (tumore cerebrale,	
□ malattia mentale		cirrosi epatica, insufficienza cardiaca,	
Attività, intolleranza all'attività Correlata a:	X	BPCO, disordini psichiatrici)	
		Concetto di se, disturbo del (autostima,	Χ
□ debolezza generalizzata□ X dolore cronico		identità personale, immagine corporea)	/\
37 1 1963 11 66		Correlato a:	
		□ X fattori fisiopatologici (aspetto, stile di vita,	
☐ X squilibrio tra apporto e richiesta di		ruolo), malattia cronica, dolore, trauma	





perdita parti del corpo / funzioni organiche		Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
□ X Fattori situazionali (senso di		Correlato a:	
abbandono/fallimento) secondari a perdita del lavoro/della capacità di lavorare,		□ X variazioni dell'aspetto,	
divorzio, perdita di persona significativa		□ X perdita di parti del corpo,	
Contaminazione, rischio di (della persona,		☐ X perdita di funzioni organiche	
della comunità, della famiglia)		Nausea Correlata a:	X
□ Esposizione ad agenti contaminanti		□ X fattori fisiopatologici ad es:ulcera gastrica	
ambientali in dosi sufficienti a provocare			
effetti nocivi per la salute (pesticidi,			
sostanze chimiche, agenti biologici, rifiuti,		Integrità cutanea,compromissione,rischio di	\ <u>\</u>
radiazioni, inquinamento)	1	Correlato a:	X
Coping inefficace Correlato a:	X	☐ X effetti della compressione, della forza di	
☐ X cronicità della condizione, variazioni		taglio, della frizione, della macerazione.	
biochimiche dell'encefalo (disordine della		Integrità mucosa orale, compromissione	X
personalità, schizofrenia, dipendenza da		Correlato a:	^ \
sostanze)		□ X inadeguata igiene orale	
□ X complessità di autocura (Morbo di		□ X incapacità di provvedere all'igiene orale	
Alzheimer, malattie in stadio terminale)		Lesione, rischio di	X
□ X alterazione dell'integrità corporea (perdita		Aspirazione, rischio di	``
di una parte del corpo, deturpazione)		Cadute, rischio di Trauma, rischio di	
□ X alterazione dello stato d'animo		Lesione da posizionamento perioperatorio	
(assunzione di sostanze, reazioni organiche,		Correlato a:	
ritardo mentale)		□ X alterazioni delle funzioni cerebrali	
☐ X inadeguate risorse psicologiche legate alle fasi di sviluppo (bambino, anziano)		secondarie a ipossia (vertigini,sincope)	
Coping inadeguato della famiglia/comunità	V	□ X alterazioni della mobilità	
Correlato a:	X	□ X inadeguata consapevolezza dei rischi	
□ X arbitraria gestione delle resistenze della		ambientali (confusione mentale)	
famiglia verso il trattamento che tende a		□ X lungo allettamento	
rafforzare atteggiamenti di difesa, poiché		□ X trattamenti (ad es: sedativi,	
non affronta l'ansia sottostante		miorilassanti)	
□ X discrepanza di stili di coping nell'affrontare		□ X gesso, stampelle, deambulatore, bastone	
compiti adattativi tra persona significativa e		☐ X diminuzione o perdita memoria a breve	
malato Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)	\ <u>\</u>	termine	
Correlato a ridotta e/o incapacità di:	X	☐ X capacità di giudizio secondaria a droghe,	
□ X lavare il proprio corpo o parti		alcol, disidratazione	
☐ X percepire il bisogno di cure igieniche		☐ X pericoli domestici (pavimenti sdrucciolevoli, scale)	
Cura di sé, deficit (vestirsi, curare il proprio	X	□ X andatura instabile	
aspetto)	^	Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	V
Correlato a ridotta e/o incapacità di:		Correlata a:	X
□ X mettersi o togliersi vestiti		□ X Alti bisogni metabolici	
□ X curare il proprio aspetto		□ X Difficoltà alla masticazione	
□ X acquistare o cambiare capi di vestiario		□ X Difficoltà di deglutizione	
Cura di sé, deficit (alimentazione)	X	□ X Fattori economici	
Correlato a incapacità di:		□ X Limitato accesso al cibo	
□ X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni		□ Nausea, vomito	
□ X portare il cibo alla bocca	1.	Nutrizione superiore al fabbisogno	X
Cura di sé, deficit (uso del gabinetto) Correlato a incapacità o mancanza di:	X	Correlata a:	
		□ X Assenza di esercizio fisico	
☐ X volontà di servirsi/trasferirsi del gabinetto o della comoda		□ X Assunzione di alimenti in risposta a stimoli	
□ X pulire il gabinetto o la comoda		interni (es: ansia)	
Dolore acuto		□ X Mancanza di conoscenze basi nutrizionali	
	X	□ X Norme culturali ed etniche	
Dolore cronico	X	□ Obesità di uno o entrambi i genitori	
Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi			_





Indicare ulteriori diagnosi infermieristiche <u>prevalenti</u> trattate nel servizio, <u>non incluse</u> nel precedente elenco	40\
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 20	10)
PROBLEMI COLLABORATIVI TRATTATI NEL SERVIZIO	
Rischio di complicanze per (INDICARE)	
(es: per sepsi, emorragia, riduzione della gittata cardiaca, edema polmonare, aritmie, trombosi venosa profonda)	
	П





APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative rilevanti per lo studente

(esempio: progetti educativi e di promozione alla salute, modelli di presa in carico, attività di ricerca e innovazione)

Ad integrazione di quanto precedentemente declinato nel documento: "Offerta formativa dei servizi sede di tirocinio in rapporto agli obiettivi educativi dell'apprendimento clinico"

segnaliamo le seguenti opportunità:

- a) Innovazione del modello di presa in carico della persona/famiglia in Cura Palliative che prevede la collaborazione della S.S. Cure Palliative con le Cure Domiciliari della Circoscrizione IV e V. Stesura del PAI, revisione periodica dello stesso in relazione ai bisogni/problemi evidenziati.

 Lavora in rete.
- b) Riunioni periodiche multi professionali d'interequipe accreditata.
- c) Partecipazione degli studenti agli eventi formativi organizzati dalla S.S. Cure Palliative