



## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti	Nome FABIO Cognome NARDINOCCHI Telefono 011/2402315 e-mail fabio.nardinocchi@unito.it
<b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	Medicina per intensità di cure Il Osp. San Giovanni Bosco 6° piano 13 camere di degenza, 36 posti letto  13.00- 14.30; 19.00- 20.30 7.00 -14.42; 14.22- 22.30; 22.25- 7.10 Medici, infermieri, oss Elettrocardiografo, ecografo, ausili per la mobilitazione Accesso ad internet per studenti
<b>Contatti e riferimenti</b>	Indirizzo Piazza Donatori di Sangue, Torino Telefono 011/2402034 Fax 011/2402314 e-mail
<b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici	



**Allegato 1**

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici  
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

**Malattie Cardiovascolari**

X

SCOMPENSO CARDIACO, TEP, TVP

**Malattie Cerebrovascolari**

X

ICTUS IN FASE POST ACUTA

**Malattie Endocrinologiche, metaboliche**

X

DIABETE MELLITO, PANCREATITE

**Malattie Intestinali / digestive**

X

DIVERTICOLOSI DEL COLON, MORBO DI CHRON, CIRROSI EPATICA

**Malattie Infettive**

X

INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE E KLEBSIELLA PNEUMONIE

**Malattie Nefrologiche, genito/urinarie**

X

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

**Malattie Neuromuscolari**

X

MORBO DI PARKINSON



<b>Malattie Oncologiche</b>	X
CARCINOMA POLMONARE, INTESTINALE, GASTRICO, OVARICO, PROSTATICO, MAMMARIO, EPATICO	
<b>Malattie Respiratorie</b>	X
BPCO, POLMONITI, VERSAMENTI PLEURICI	
<b>Salute Mentale</b>	X
DEMENZA SENILE, ALZHEIMER	



## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

#### Ansia X

Fattori correlati

##### Fisiopatologici

- Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza

##### Situazionali (personali, ambientali)

- Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)
- Perdita reale o percepita di persone significative
- Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)
- Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)
- Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)

##### Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto
- Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei
- Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio
- Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento

#### Aspirazione, rischio di X

Fattori correlati

##### Fisiopatologici

- Riduzione del livello di coscienza ( per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)
- Depressione dei riflessi della tosse/faringeo
- Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)
- Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)
- Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)
- Fistola tracheo-esofagea
- Compromissione dei riflessi protettivi ( chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)

##### Trattamenti

- Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)
- Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)



**Situazionali (personali, ambientali)**

- Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo
- Assunzione di alimenti in corso di intossicazione

**Fasi di sviluppo**

- Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione
- Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore
- Persona anziana: dentizione inadeguata**

**Attività, intolleranza all'attività**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per

- Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)
- Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare)**
- Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)**

**Aumento del fabbisogno metabolico per**

- Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)**
- Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)**
- Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)**

**Trattamenti**

- Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)**
- Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)**

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario,insufficiente conoscenza)**
- Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)**
- Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)**

**Fasi di sviluppo**

- Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali**

**Autostima, Disturbo/Rischio di**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)**
- Deturpazione**
- Squilibri biochimici, neurofisiologici**

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Bisogno di dipendenza non soddisfatto**
- Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)**
- Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali,**



<p>parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità</li> <li><input type="checkbox"/> Insuccesso scolastico</li> <li><input type="checkbox"/> Relazione inefficace con i propri genitori</li> <li><input type="checkbox"/> Relazioni abusive</li> <li><input type="checkbox"/> Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli</li> <li><input type="checkbox"/> Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> Storia di numerosi insuccessi</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone</li> <li><input type="checkbox"/> Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi)</li> <li><input type="checkbox"/> Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative</li> <li><input type="checkbox"/> Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</li> </ul>
---

<b>Cadute, rischio</b>	<b>X</b>
Vedere lesione, rischio	

<b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver</li> <li><input type="checkbox"/> Modello di coping inefficace</li> <li><input type="checkbox"/> Salute fisica compromessa</li> <li><input type="checkbox"/> Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</li> <li><input type="checkbox"/> Durata dell'assistenza richiesta</li> <li><input type="checkbox"/> Isolamento</li> <li><input type="checkbox"/> Pause di riposo/svago insufficienti o</li> <li><input type="checkbox"/> Risorse economiche insufficienti</li> <li><input type="checkbox"/> Assenza o non disponibilità di sostegno</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)</li> </ul>	



**Confusione mentale acuta** X

Fattori correlati

**Fattori di rischio**

Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per

- Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/ipernatremia, ipo/iperglicemia)
- Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)
- Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)
- Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)
- Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)
- Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)
- Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)

**Trattamenti**

- Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.
- Dolore, fecaloma, immobilità,
- Depressione, situazioni non familiari
- Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)

**Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)** X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Presenza di batteri, virus, tossine
- Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)
- Stati patologici pre-esistenti
- Genere
- Storia di fumo

**Trattamenti**

- Vaccinazioni recenti
- Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione
- Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati

**Situazionali (personali, ambientali)**



- Alluvioni, terremoti, disastri naturali.
- Perdite rete fognaria
- Emissioni da impianti industriali: scarichi intenzionali o accidentali di contaminanti da locali commerciali o industriali, inquinamento delle falde acquifere
- Fattori fisici: condizioni climatiche, area geografica
- Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria
- Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori)
- Bioterrorismo
- Tipo di lavoro
- Pratiche dietetiche
- Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche
- Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni

**Fasi di sviluppo**

- Caratteristiche evolutive dei bambini
- Bambini di età inferiore a 5 anni
- Persone anziane
- Età gestazionale durante l'esposizione

**Coping inefficace**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

**Trattamenti**

- Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- Disorganizzazione del sistema familiare
- Inefficace capacità di problem solving
- Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress
- Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)
- Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)
- Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale ( ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

**Fasi di sviluppo**





- Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche**

**Cura di sé, deficit (alimentazione)**

X

**Incapacità di (specificare):**

- tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- portare il cibo alla bocca

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)
- Paralisi per (specificare)**
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Deficit cognitivi**
- Dolore**
- Scarsa motivazione**
- Affaticamento**
- Confusione mentale**
- Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare**

**Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)**

X

**Ridotta e/o incapacità di (specificare):**

- lavare il proprio corpo o parti
- procurarsi l'acqua



<input type="checkbox"/> <b>regolare la temperatura o il flusso dell'acqua</b> <input type="checkbox"/> <b>percepire il bisogno di cure igieniche</b>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Stato comatoso</li> <li><input type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> <li><input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti</li> <li><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li> <li><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li> <li><input type="checkbox"/> Deficit somatici</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li><input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> <li><input type="checkbox"/> Dolore</li> <li><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input type="checkbox"/> Confusione mentale</li> <li><input type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	

<p><b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b></p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti</li> <li><input type="checkbox"/> curare il proprio aspetto</li> <li><input type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario</li> <li><input type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua</li> <li><input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</li> </ul>	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Stato comatoso</li> </ul>	



<input type="checkbox"/> <b>Disturbi visivi</b> <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <b>Trattamenti</b> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input type="checkbox"/> <b>Deficit cognitivi</b> <input type="checkbox"/> <b>Dolore</b> <input type="checkbox"/> <b>Scarsa motivazione</b> <input type="checkbox"/> <b>Affaticamento</b> <input type="checkbox"/> <b>Confusione mentale</b> <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
---

<b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b> <b>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</b> <input type="checkbox"/> <b>servirsi del gabinetto/comoda</b> <input type="checkbox"/> <b>trasferirsi sul gabinetto/comoda</b> <input type="checkbox"/> <b>eseguire pratiche igieniche adeguate</b> <input type="checkbox"/> <b>pulire il gabinetto o la comoda</b> <input type="checkbox"/> <b>sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> <b>Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</b> <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> <b>Debolezza muscolare per (specificare)</b> <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> <b>Contratture muscolari per (specificare)</b> <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> <b>Disturbi visivi</b> <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <b>Trattamenti</b> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input type="checkbox"/> <b>Deficit cognitivi</b> <input type="checkbox"/> <b>Dolore</b> <input type="checkbox"/> <b>Scarsa motivazione</b>
---



<input checked="" type="checkbox"/> <b>Affaticamento</b> <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--

<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b> <b>Difficoltà a (specificare)</b> <input type="checkbox"/> usare il telefono <input type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> lavare e stirare <input type="checkbox"/> preparare i pasti <input type="checkbox"/> fare la spesa <input type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> <b>assumere i farmaci</b>	<b>X</b>
--	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatiformi <b>Trattamenti</b> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> <b>Confusione mentale</b> <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
---

<b>Deglutizione, compromissione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b>	



<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)</li> <li><input type="checkbox"/> Tumore / edema tracheo-esofageo</li> <li><input type="checkbox"/> Irritazione della cavità orofaringea</li> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione della salivazione</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso</li> <li><input type="checkbox"/> Riduzione della coscienza per anestesia</li> <li><input type="checkbox"/> Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica</li> <li><input type="checkbox"/> Esofagite da radioterapia</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Alterazione del livello di coscienza</li> <li><input type="checkbox"/> Fatigue</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto</li> </ul>
---

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Disordini muscolo scheletrici</b> (fratture, <b>artrite</b>, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li><input type="checkbox"/> Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Cancro</b></li> <li><input type="checkbox"/> Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li><input type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive</b> (rosolia, <b>pancreatite, epatite</b>, mononucleosi, varicella)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Effetti di un tumore su (specificare)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</b></li> <li><input type="checkbox"/> Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> <li><input type="checkbox"/> Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Per nausea e vomito secondari a chemioterapia</b>, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Febbre</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Immobilità/posizionamento inappropriato</b></li> <li><input type="checkbox"/> Iperattività</li> <li><input type="checkbox"/> Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li><input type="checkbox"/> Risposta allergica</li> <li><input type="checkbox"/> Irritanti chimici</li> </ul>	



- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

**Eliminazione urinaria compromessa**

Per Incontinenza urinaria (specificare):

- Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)**
- Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)**
- Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)**
- Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)**
- Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)**
- Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)**
- Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)**

**Trattamenti**

- Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)

**Fatigue**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)
- Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)**
- Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)**
- Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla, SLA, M. Parkinson, AIDS)**
- Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore
- Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)**
- Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)**

**Trattamenti**

- Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,**
- Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)**
- Eccessive richieste di ruolo
- Richieste emozionali soverchianti
- Stress emotivo



- Disturbi del sonno

**Immobilizzazione, sindrome da**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Riduzione del sensorio
- Stato di incoscienza
- Compromissione neuromuscolare** (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)
- Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)
- Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)
- Cancro**

Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)

**Trattamenti**

- Intervento chirurgico
- Ventilazione meccanica
- Linee venose**
- Trazione/gesso/tutore ortopedico
- Immobilità prescritta**

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Depressione**
- Fatigue**
- Stato di debilitazione**
- Dolore**

**Fasi di sviluppo**

- Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida
- Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile**

**Incontinenza fecale**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione dello sfintere rettale ( per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)
- Compromissione delle funzioni cognitive**
- Iperdistensione rettale per stipsi cronica**
- Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)**
- Trattamenti
- Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

**Incontinenza urinaria da sforzo**

X



<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie</li> <li><input type="checkbox"/> Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale</li> <li><input type="checkbox"/> Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Persona anziana: perdita di tono muscolare</b></li> </ul>		
<b>Incontinenza urinaria da urgenza</b>		<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Diminuzione della capacità vescicale per infezione</b>, malattie demielinizzanti, <b>ictus cerebrale</b>, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/<b>tumori</b>/infezioni, parkinsonismo</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale,</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza</b></li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi</li> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bambino: limitata capacità vescicale</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Persona anziana: diminuita capacità vescicale</b></li> </ul>		
<b>Incontinenza urinaria funzionale</b>		<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Diminuzione di stimoli vescicali</b>/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, <b>parkinsonismo</b>, <b>sclerosi multipla</b>, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, <b>ictus cerebrale</b>, <b>demenza progressiva</b></li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorellassanti</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Compromissione della mobilità</b></li> <li><input type="checkbox"/> Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)</b></li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Persona anziana: perdite motorie/sensitive</b></li> </ul>		
<b>Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)</b>		<b>X</b>
Fattori correlati		





#### **Fisiopatologici**

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria
- Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

#### **Trattamenti**

- Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- Strumentazione diagnostica
- Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)

#### **Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione della mobilità
- Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

#### **Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

**Infezione, rischio di**

**X**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)
- Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica

**Trattamenti**

- Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale
- Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità
- Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio
- gessato, pieghe cutanee)
- Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)

**Fasi di sviluppo**

- Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo
- Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali
- Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)

**Insonnia**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)
- Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)
- Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)
- Eccessivo dormire di giorno
- Depressione
- Inadeguata attività fisica durante il giorno
- Dolore cronico
- Risposte ansiose
- Modifiche ambientali (specificare)
- Paura
- Frequenti risvegli dei bambini
- Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)



<b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>	<b>X</b>
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Inadeguata igiene orale</li> <li><input type="checkbox"/> Incapacità di provvedere all'igiene orale</li> </ul>
---

<b>Ipertermia</b>	<b>X</b>
-------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)</li> </ul> <p><b>Situazionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Esposizione al calore, al sole</li> <li><input type="checkbox"/> Abbigliamento inadeguato al clima</li> <li><input type="checkbox"/> Assenza di condizionamento dell'aria</li> <li><input type="checkbox"/> Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero</li> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)</li> <li><input type="checkbox"/> Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età</li> </ul>
---

<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
----------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)</li> <li><input type="checkbox"/> Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)</li> <li><input type="checkbox"/> Fatigue</li> <li><input type="checkbox"/> Ipotensione ortostatica</li> <li><input type="checkbox"/> Insufficienza vertebro basilare</li> <li><input type="checkbox"/> Disturbi vestibolari</li> <li><input type="checkbox"/> Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)</li> <li><input type="checkbox"/> Movimenti tonico-clonici (convulsioni)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungo allettamento</li> <li><input type="checkbox"/> Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Gesso, stampelle, deambulatore, bastone</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione o perdita memoria a breve termine</li> <li><input type="checkbox"/> Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)</li> <li><input type="checkbox"/> Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)</li> <li><input type="checkbox"/> Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)</li> </ul>
--



- Pericolo di incendio
- Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- Scarpe inadatte,
- Disattenzione del caregiver
- Uso improprio degli ausili
- Storia di incidenti
- Andatura instabile

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli
- Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

**Liquidi, eccessivo volume di**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipodema)
- Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

**Trattamenti**

- Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)
- Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- Ristagno venoso declive/venostasi ( per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)
- Compromissione venosa da utero gravido

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

**Liquidi, insufficiente volume di**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Vomito/nausea
- Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- Dieta scorretta/digiuno
- Nutrizione per sonda con soluzione concentrata



- Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
- Esposizione a climi estremi
- Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
- Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

**Memoria, compromissione**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
- Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
- Deficienze nutrizionali

**Trattamenti**

- Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Aspettative che si auto realizzano
- Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- Consumo di alcol
- Mancanza di motivazione
- Inadeguata stimolazione
- Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni)

**Mobilità, compromissione /rischio di**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- edemi
- apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)
- forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- fatigue
- obesità
- mancanza di motivazione



<input type="checkbox"/> dispnea <input type="checkbox"/> dolore <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite <input type="checkbox"/> <b>Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare</b>
---

<b>Nausea</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per <b>gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite</b> , infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare) <b>Trattamenti</b> <input type="checkbox"/> <b>Effetti della chemioterapia e/o farmaci</b> <input type="checkbox"/> Effetti dell'anestesia	

<b>Non adesione (a indicazioni terapeutiche)</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> <b>Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)</b> <input type="checkbox"/> Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato <b>Trattamenti</b> <input type="checkbox"/> Effetti collaterali della terapia <input type="checkbox"/> Ambiente non terapeutico <input type="checkbox"/> Terapia complessa non controllata/prolungata <input type="checkbox"/> Costo economico della terapia <input type="checkbox"/> Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace <input type="checkbox"/> Processo di presa in carico impersonale (multi professionale) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input type="checkbox"/> Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente) <input type="checkbox"/> Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) <input type="checkbox"/> Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio <input type="checkbox"/> Modificazione dello stato lavorativo <input type="checkbox"/> Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie <input type="checkbox"/> <b>Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)</b>	

<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
---	----------



**Fattori correlati**

**Fisiopatologici**

- Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)**
- Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)**
- Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)**
- Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)**
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)**
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)**
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo**

**Trattamenti**

- Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)**
- Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)**

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)**
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- Diarrea**

**Fasi di sviluppo**

- Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)
- Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)
- Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)

**Nutrizione superiore al fabbisogno**

X

**Fattori correlati**

**Fisiopatologici**

- Alterato modello di sazietà (specificare)
- Riduzione dei sensi di gusto/olfatto

**Trattamenti**

- Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)





**Situazionali (personali, ambientali)**

- Rischio di aumento ponderale in gravidanza superiore a 12/13 Kg
- Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali

**Fasi di sviluppo**

- Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico**

**Respirazione, inefficace funzionalità, rischio**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)**
- Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)**

**Trattamenti**

- Immobilità** (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)
- Soppressione del riflesso della tosse**
- Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Immobilità** (per intervento chirurgico/trauma, **compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia**)
- Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)

**Stipsi**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)
- Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)
- Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)
- Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)
- Diminuita peristalsi** secondaria a ipossia cardiaca/**polmonare NELL'ANZIANO**
- Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile
- Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)

**Trattamenti**

- Effetti collaterali di farmaci (specificare)
- Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica
- Uso abituale di lassativi
- Mucosite secondaria a radiazioni

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
- Modello di evacuazione irregolare
- Credenze culturali/sulla salute
- Mancanza di riservatezza





- Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
- Paura di dolore rettale o cardiaco
- Valutazioni errate
- Incapacità di percepire i segnali intestinali



### Allegato 3

#### **PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI**

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per ipertensione endocranica	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per ileo paralitico	X
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

-OPPORTUNITA' DI PRENDERE IN CARICO GLOBALMENTE IL PAZIENTE E DI SVILUPPARE IL

RAGIONAMENTO CLINICO NELLA SUA TOTALITA'

-INNOVAZIONI:TERAPIA INFORMATIZZATA,UTILIZZO DELL'ECOGRAFO IN REPARTO PER IL REPERIMENTO

DI ACCESSI VENOSI,TORACENTESI/PARACENTESI,POSIZIONAMENTO DI DRENAGGI TORACICI

-POSSIBILITA' DI POTER SPERIMENTARE DIVERSE TECNICHE INFERMIERISTICHE