



## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti	Nome Debora Cognome Cattaldo Telefono 011/2402292-2417 e-mail debora.cattaldo@unito.it
<b>Struttura/servizio</b>  Nominativo, ubicazione, ecc  N°locali, n° posti letto,  Orari apertura al pubblico,  Orari di lavoro,  Figure professionali	S.C. Neurologia 2 - Neurochirurgia  9 camere (4 di neurochirurgia e 5 di neurologia) con 28 posti letto (10 di neurochirurgia e 18 di neurologia) con la possibilità di aggiungere tre bis, 1 infermeria, 1 ufficio coordinatore infermieristico, 2 studi medici (1 neurochirurgico e 1 neurologico), 1 ufficio facente funzione del direttore di struttura della neurologia, 1 sala visita, 1 cucina, 1 locale adibito a magazzino, 1 locale adibito a smaltimento rifiuti, due locali con servizi igienici per degenti disabili e non, 1 bagno per il personale di reparto  Dalle h 13.30 alle h 14.30 e dalle h 19.00 alle h 20.30  Gli orari di servizio sono articolati in 3 fasce di turni: mattino 07.00-14.42 pomeriggio 14.32-22.35 notte 22.25-07.10  1 coordinatore infermieristico 21 infermieri ( di cui 3 in maternità e 3 con rapporto di lavoro part-time) dipendenti del presidio ospedaliero e 2 infermieri ( di cui 1 con rapporto di lavoro part-time) appartenenti all'agenzia interinale 1 infermiere generico 6 OSS ( di cui 1 con rapporto di lavoro part-time) dipendenti del presidio ospedaliero e 3 OSS con rapporto di lavoro part-time appartenenti all'agenzia interinale 2 facente funzioni di direttore di struttura complessa ( 1 di neurochirurgia e 1 di neurologia) 5 neurochirurghi e 6 neurologi 1 segretaria



<b>Risorse strumentali</b>	Monitor multiparametrici Pompe infusionali per la terapia endovenosa e pompe nutrizionali per la terapia enterale Materassi antidecubito Set di Becker per il drenaggio liquorale Sollevamalati Elettrocardiografo Computer per la terapia informatizzata e per la cartella clinica integrata Carrello urgenze con defibrillatore
Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	Accesso internet Protocolli e procedure di reparto e aziendali
<b>Contatti e riferimenti</b>	Indirizzo P.za Donatori di Sangue 3 Telefono 011-2402974/2292 Fax 011-2402214 e-mail
<b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici	Pullman numero 2-57 e 75



## Allegato 1

### Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche

Disabilità, malattie ad alto grado di tutela

Malattie Cardiovascolari

Malattie Cerebrovascolari

Malattie Endocrinologiche, metaboliche

Malattie Intestinali / digestive

Malattie Infettive



<b>Malattie Nefrologiche, genito/urinarie</b>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

--	--

<b>Malattie Neuromuscolari</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

--	--

<b>Malattie Oncologiche</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------

--	--

<b>Malattie Osteoarticolari</b>	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------

--	--

<b>Malattie Rare</b>	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------

--	--

<b>Malattie Respiratorie</b>	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------

--	--

<b>Malattie Traumatologiche / incidenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

--	--

<b>Salute degli Immigrati/immigrate</b>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

--	--



**Salute in area Materno / infantile**



**Salute Mentale**



**Altro (specificare)**





## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

#### Allattamento al seno, inefficace, interrotto

Fattori correlati

##### Fisiologici

Difficoltà del neonato ad attaccarsi al seno o succhiare il latte secondario a :

- Retrazione dei capezzoli, inadeguato riflesso di eiezione del latte, stress
- Labio-palatoschisi
- Prematurità
- Pregresso intervento chirurgico al seno

##### Situazionali

- Fatigue, ansia, ambivalenza della madre
- Parto multiplo
- Inadeguata assunzione di nutrienti/liquidi
- Allattamento insoddisfacente
- Insufficiente sostegno di partner/familiari
- Insufficienti conoscenze
- Interruzione dell'allattamento per malattia della madre o del lattante
- Necessità di svezzare rapidamente il neonato
- Orario di lavoro e/o ostacoli nell'ambiente di lavoro
- Controindicazioni all'allattamento materno (es. farmaci, ittero da latte materno)

#### Alimentazione del bambino, inefficace modello di (dalla nascita ai 9 mesi)

Fattori correlati

##### Fisiopatologici

Aumento del fabbisogno calorico secondario a:

- Instabilità della temperatura corporea
- Tachipnea con aumento dello sforzo respiratorio
- Infezione
- Labioschisi e/o palatoschisi
- Sviluppo fisico
- Cicatrizzazione di ferite
- Scompenso o malattia degli organi vitali

Debolezza/ipotonia muscolare secondaria a

- Malnutrizione
- Prematurità
- Malattia acuta/cronica
- Letargia
- Difetti congeniti
- Scompenso o malattia di organi vitali
- Ritardo/compromissione neurologica
- Iperbilirubinemia



### Trattamenti

- Stato ipermetabolico (intervento chirurgico, procedure dolorose)
- Debolezza muscolare (farmaci, deprivazione del sonno)
- Ipersensibilità orale
- Precedente digiuno prolungato

### Situazionali

- Incongruenze fra i caregiver (che provvedono all'alimentazione)
- Mancanza di conoscenze o di impegno da parte dei caregiver in rapporto a regime dietetico o a bisogni alimentari
- Presenza di stimoli orali o facciali nocivi e/o assenza di stimoli orali
- Inadeguata produzione di latte materno

## Ansia

X

Fattori correlati

### Fisiopatologici

- Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza

### Situazionali (personali, ambientali)

X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)

- Perdita reale o percepita di persone significative

X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)

- Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)

- Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)

### Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto
- Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei
- Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicità di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio

X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento

## Aspirazione, rischio di

Fattori correlati

### Fisiopatologici

X Riduzione del livello di coscienza ( per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)

- X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo
- Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)
- Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)
- X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)
- Fistola tracheo-esofagea
- X Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo,



paraplegia/emiplegia)

**Trattamenti**

- X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)
- X Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo
- Assunzione di alimenti in corso di intossicazione

**Fasi di sviluppo**

- Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione
- Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore
- X Persona anziana: dentizione inadeguata

**Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Interruzione del processo di attaccamento per

- Malattia del genitore/ del bambino

**Trattamenti**

Barriere all'attaccamento secondarie a

- Mancanza di riservatezza
- Apparecchiature, monitoraggio intensivo
- Limitazione dei visitatori, visite rigidamente strutturate

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Aspettative non realistiche (nei confronti del bambino, di se stessi)
- Gravidanza indesiderata
- Delusione nei confronti del bambino ( es. per il sesso, per l'aspetto)
- Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, abuso di sostanze, difficoltà economiche, malattia mentale)
- Scarsa conoscenza e/o disponibilità dei modelli di ruolo genitoriale
- Disabilità fisica del genitore (es. cecità, paralisi, sordità)
- Inadeguata preparazione emotiva dovuta a nascita prematura del bambino

**Attività, intolleranza all'attività**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per

- Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)
- Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispasia broncopolmonare)
- Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)

Aumento del fabbisogno metabolico per

- Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)
- X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)
- Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)

**Trattamenti**

- X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)
- X Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)

**Situazionali (personali, ambientali)**





- Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)
- X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)
- X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)

**Fasi di sviluppo**

- X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali

**Autolesionismo, automutilazione, rischio di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale)

**Personalì**

- Pregressi episodi di autolesionismo
- Abusi fisici, psichici, o sessuali
- Inefficaci capacità di coping
- Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti

**Fasi di sviluppo**

- Bambino/adolescente: correlati all'abuso

**Autostima, Disturbo/Rischio di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)
- Deturpazione
- X Squilibri biochimici, neurofisiologici

**Situazionali (personalì, ambientali)**

- X Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)
- Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)
- Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità
- Insuccesso scolastico
- Relazione inefficace con i propri genitori
- Relazioni abusive
- Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli
- Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione
- Storia di numerosi insuccessi

**Fasi di sviluppo**

- Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone
- Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi)
- Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative



- Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento
- Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento

**Avvelenamento, rischio**

Vedere lesione, rischio



**Cadute, rischio**

Vedere lesione, rischio



**Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)

**Trattamenti**

- X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver
- Modello di coping inefficace
- Salute fisica compromessa
- Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
- Durata dell'assistenza richiesta
- Isolamento
- Pause di riposo/svago insufficienti o
- Risorse economiche insufficienti
- Assenza o non disponibilità di sostegno

**Fasi di sviluppo**

- Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)

**Casa, compromessa gestione**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.
- Mancata disponibilità di un sistema di sostegno
- Perdita di un familiare
- Deficit di conoscenze
- Insufficienza di risorse economiche

**Fasi di sviluppo**

- Bambino (correlata all'esigenza di cure molteplici)
- Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)



<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Paralisi delle corde vocali, tetraplegia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)</li> <li><input type="checkbox"/> Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere psicologiche (paura, timidezza)</li> <li><input type="checkbox"/> Mancanza di riservatezza</li> <li><input type="checkbox"/> Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale)</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana (perdite uditive)</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione cognitiva per (specificare patologia)</li> </ul>	
<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Immobilità o perdita di funzioni</li> <li><input type="checkbox"/> Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li> <li><input type="checkbox"/> Preferenze sessuali</li> <li><input type="checkbox"/> Gravidanza nel corso dell'adolescenza</li> <li><input type="checkbox"/> Differenza di sesso nell'educazione dei figli</li> <li><input type="checkbox"/> Esperienze di violenza da parte dei genitori</li> <li><input type="checkbox"/> Cambiamento del consueto modello di responsabilità</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</li> </ul>	



<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fattori di rischio</b></p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <p>X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</li> <li><input type="checkbox"/> Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)</li> <li><input type="checkbox"/> X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)</li> <li><input type="checkbox"/> X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)</li> <li><input type="checkbox"/> X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)</li> <li><input type="checkbox"/> X Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenintoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</li> <li><input type="checkbox"/> X Dolore, fecaloma, immobilità,</li> <li><input type="checkbox"/> Depressione, situazioni non familiari</li> <li><input type="checkbox"/> Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)</li> </ul>	

<b>Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)</b>	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Presenza di batteri, virus, tossine</li> <li><input type="checkbox"/> Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)</li> <li><input type="checkbox"/> Stati patologici pre-esistenti</li> <li><input type="checkbox"/> Genere</li> <li><input type="checkbox"/> Storia di fumo</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vaccinazioni recenti</li> <li><input type="checkbox"/> Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione</li> <li><input type="checkbox"/> Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Alluvioni, terremoti, disastri naturali.</li> <li><input type="checkbox"/> Perdite rete fognaria</li> <li><input type="checkbox"/> Emissioni da impianti industriali:scarichi intenzionali o accidentali di contaminanti da locali commerciali o industriali, inquinamento delle falde acquifere</li> <li><input type="checkbox"/> Fattori fisici:condizioni climatiche, area geografica</li> <li><input type="checkbox"/> Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria</li> <li><input type="checkbox"/> Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori)</li> <li><input type="checkbox"/> Bioterrorismo</li> </ul>	



- Tipo di lavoro
- Pratiche dietetiche
- Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche
- Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni

**Fasi di sviluppo**

- Caratteristiche evolutive dei bambini
- Bambini di età inferiore a 5 anni
- Persone anziane
- Età gestazionale durante l'esposizione

**Coping inadeguato della famiglia**



Fattori correlati

**Biofisiopatologici**

- Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)
- Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli
- Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori
- Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli

**Coping inefficace**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

**Trattamenti**

- Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- Disorganizzazione del sistema familiare
- Inefficace capacità di problem solving
- Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress
- Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)
- Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)
- Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale ( ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)



**Fasi di sviluppo**

- Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

**Cura di sé, deficit (alimentazione)**

**Incapacità di (specificare):**

- X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- X portare il cibo alla bocca

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- X Spasticità o flaccidità per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
- X Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Deficit cognitivi
- Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- X Confusione mentale
- Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare



<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> <b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b> <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> X Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> X Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> X Paralisi per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> X Stato comatoso</li> <li><input type="checkbox"/> X Disturbi visivi</li> <li><input type="checkbox"/> X Arti non funzionanti o mancanti</li> <li><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li> <li><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li> <li><input type="checkbox"/> Deficit somatici</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li><input type="checkbox"/> X Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> X Deficit cognitivi</li> <li><input type="checkbox"/> X Dolore</li> <li><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input type="checkbox"/> X Confusione mentale</li> <li><input type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	

<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> <b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b> <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> X Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> X Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> X Paralisi per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> X Stato comatoso</li> <li><input type="checkbox"/> X Disturbi visivi</li> <li><input type="checkbox"/> X Arti non funzionanti o mancanti</li> </ul>	





- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Deficit cognitivi
- Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- X Confusione mentale
- Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

**Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)**

**Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):**

- x servirsi del gabinetto/comoda**
- x trasferirsi sul gabinetto/comoda**
- x eseguire pratiche igieniche adeguate**
- x pulire il gabinetto o la comoda**
- x sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- X Spasticità o flaccidità per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Deficit cognitivi
- Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- X Confusione mentale
- Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare





<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Difficoltà a (specificare)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> usare il telefono</li> <li><input type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto</li> <li><input type="checkbox"/> lavare e stirare</li> <li><input type="checkbox"/> preparare i pasti</li> <li><input type="checkbox"/> fare la spesa</li> <li><input type="checkbox"/> gestire il denaro</li> <li><input type="checkbox"/> assumere i farmaci</li> </ul>	
<b>Fattori correlati</b> <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Stato comatoso</li> <li><input type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> <li><input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti</li> <li><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li> <li><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li> <li><input type="checkbox"/> Deficit somatiformi</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li><input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> <li><input type="checkbox"/> Dolore</li> <li><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input type="checkbox"/> Confusione mentale</li> <li><input type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	

<b>Deambulazione, compromissione, rischio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vedere mobilità, compromissione, rischio</b>	

<b>Deglutizione, compromissione</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fattori correlati</b> <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Tumore / edema tracheo-esofageo</li> <li><input type="checkbox"/> Irritazione della cavità orofaringea</li> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione della salivazione</li> </ul> <b>Trattamenti</b>	



- Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso
- Riduzione della coscienza per anestesia
- X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica
- Esofagite da radioterapia

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Alterazione del livello di coscienza
- X Fatigue

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione
- Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto

**Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)**

**X**

**Fattori correlati**

**Fisiopatologici**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Cancro
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

**Trattamenti**

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomtria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- Iperattività
- Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

**Fasi di sviluppo**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- 1 anno: coliche
- Prima infanzia: dentizione, otalgia
- Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
- Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.



**Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

**Trattamenti**

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Febbre
- Immobilità/posizionamento inappropriato
- Iperattività
- Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

**Eliminazione urinaria compromessa**

**Per Incontinenza urinaria (specificare):**

- Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)**
- Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)**
- Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)**
- Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)**
- Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)**
- Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)
- Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

**Trattamenti**

- Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)



<b>Eminegligenza</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale</li> </ul>	
<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)</li> <li><input type="checkbox"/> Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)</li> <li><input type="checkbox"/> Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla., SLA, M. Parkinson, AIDS)</li> <li><input type="checkbox"/> Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore</li> <li><input type="checkbox"/> Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)</li> <li><input type="checkbox"/> Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,</li> <li><input type="checkbox"/> Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)</li> <li><input type="checkbox"/> Eccessive richieste di ruolo</li> <li><input type="checkbox"/> Richieste emozionali soverchianti</li> <li><input type="checkbox"/> Stress emotivo</li> <li><input type="checkbox"/> Disturbi del sonno</li> </ul>	
<b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X variazione dell'aspetto ( per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)</li> </ul>	



Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Riduzione del sensorio</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Stato di incoscienza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)</li> <li><input type="checkbox"/> Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Cancro</li> </ul> <p>Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Intervento chirurgico</li> <li><input type="checkbox"/> Ventilazione meccanica</li> <li><input type="checkbox"/> Linee venose</li> <li><input type="checkbox"/> Trazione/gesso/tutore ortopedico</li> <li><input type="checkbox"/> Immobilità prescritta</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Depressione</li> <li><input type="checkbox"/> Fatigue</li> <li><input type="checkbox"/> Stato di debilitazione</li> <li><input type="checkbox"/> Dolore</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</li> </ul>	

Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione dello sfintere rettale ( per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione delle funzioni cognitive</li> <li><input type="checkbox"/> Iperdistensione rettale per stipsi cronica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)</li> <li><input type="checkbox"/> Trattamenti</li> <li><input type="checkbox"/> Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)</li> </ul>	

Incontinenza urinaria da sforzo	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie</li> <li><input type="checkbox"/> Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p>	



- Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale
- Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: perdita di tono muscolare

**Incontinenza urinaria da urgenza**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo

**Trattamenti**

- Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale,
- Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi
- Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: limitata capacità vescicale
- Persona anziana: diminuita capacità vescicale

**Incontinenza urinaria funzionale**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva

**Trattamenti**

- Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione della mobilità
- Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

**Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria
- Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

**Trattamenti**

- Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica



<p>estensiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Strumentazione diagnostica</li> <li><input type="checkbox"/> Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromissione della mobilità</li> <li><input type="checkbox"/> Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>
--

<b>Infezione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</li> <li><input type="checkbox"/> Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio)</li> <li><input type="checkbox"/> gessato, pieghe cutanee)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> x Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo</li> <li><input type="checkbox"/> Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</li> </ul>	

<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</li> </ul>	



- Eccessivo dormire di giorno
- Depressione
- Inadeguata attività fisica durante il giorno
- Dolore cronico
- Risposte ansiose
- X Modifiche ambientali (specificare)
- Paura
- Frequenti risvegli dei bambini
- Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)

**Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio**

Fattori correlati  
**Fisiopatologici**

- Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia, ..)

**Integrità mucosa orale, compromissione**

Fattori correlati

- X Inadeguata igiene orale
- X Incapacità di provvedere all'igiene orale

**Ipertermia**

Fattori correlati

**Trattamenti**

- Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)

**Situazionali**

- Esposizione al calore, al sole
- Abbigliamento inadeguato al clima
- Assenza di condizionamento dell'aria
- Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero
- Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)
- Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa

**Fasi di sviluppo**

- Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età

**Ipotermia**

Fattori correlati

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento
- Vestiario inadatto al clima
- Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento
- Diminuzione della circolazione ( per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)

**Fasi di sviluppo**

- Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)





<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)</li> <li><input type="checkbox"/> Fatigue</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Ipotensione ortostatica</li> <li><input type="checkbox"/> Insufficienza vertebro basilare</li> <li><input type="checkbox"/> Disturbi vestibolari</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)</li> <li><input type="checkbox"/> Movimenti tonico-clonici (convulsioni)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Lungo allettamento</li> <li><input type="checkbox"/> Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Gesso, stampelle, deambulatore, bastone</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione o perdita memoria a breve termine</li> <li><input type="checkbox"/> Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)</li> <li><input type="checkbox"/> Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)</li> <li><input type="checkbox"/> Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)</li> <li><input type="checkbox"/> Pericolo di incendio</li> <li><input type="checkbox"/> Ambiente non familiare (es. Ospedale)</li> <li><input type="checkbox"/> Scarpe inadatte,</li> <li><input type="checkbox"/> Disattenzione del caregiver</li> <li><input type="checkbox"/> Uso improprio degli ausili</li> <li><input type="checkbox"/> Storia di incidenti</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Andatura instabile</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare</li> </ul>	

<b>Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio</b>	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione)</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi)</li> <li><input type="checkbox"/> Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento</li> <li><input type="checkbox"/> Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia</li> <li><input type="checkbox"/> Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore</li> <li><input type="checkbox"/> Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento</li> </ul>	



**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano)

**Fasi di sviluppo**

- Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata)

**Liquidi, eccessivo volume di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipodema)
- Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

**Trattamenti**

- Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)
- Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- Ristagno venoso declive/venostasi ( per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)
- Compromissione venosa da utero gravido

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

**Liquidi, insufficiente volume di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Vomito/nausea
- Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- Dieta scorretta/digiuno
- Nutrizione per sonda con soluzione concentrata
- Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
- Esposizione a climi estremi
- Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
- Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: aumentata vulnerabilità ( ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete



<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Alterazioni del SNC ( per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico</li> <li><input type="checkbox"/> Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento</li> <li><input type="checkbox"/> Deficienze nutrizionali</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aspettative che si auto realizzano</li> <li><input type="checkbox"/> Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)</li> <li><input type="checkbox"/> Consumo di alcol</li> <li><input type="checkbox"/> Mancanza di motivazione</li> <li><input type="checkbox"/> Inadeguata stimolazione</li> <li><input type="checkbox"/> Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni)</li> </ul>	

<b>Mobilità, compromissione /rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare ( malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)</li> <li><input type="checkbox"/> riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)</li> <li><input type="checkbox"/> rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)</li> <li><input type="checkbox"/> edemi</li> <li><input type="checkbox"/> apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)</li> <li><input type="checkbox"/> forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> fatigue</li> <li><input type="checkbox"/> obesità</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di motivazione</li> <li><input type="checkbox"/> dispnea</li> <li><input type="checkbox"/> dolore</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare</li> </ul>	

<b>Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Vedere mobilità, compromissione, rischio</b>	



<b>Nausea</b>	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Effetti della chemioterapia e/o farmaci</li> <li><input type="checkbox"/> Effetti dell'anestesia</li> </ul>	

<b>Non adesione (a indicazioni terapeutiche)</b>	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)</li> <li><input type="checkbox"/> Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Effetti collaterali della terapia</li> <li><input type="checkbox"/> Ambiente non terapeutico</li> <li><input type="checkbox"/> Terapia complessa non controllata/prolungata</li> <li><input type="checkbox"/> Costo economico della terapia</li> <li><input type="checkbox"/> Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace</li> <li><input type="checkbox"/> Processo di presa in carico impersonale (multi professionale)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)</li> <li><input type="checkbox"/> Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio</li> <li><input type="checkbox"/> Modificazione dello stato lavorativo</li> <li><input type="checkbox"/> Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)</li> </ul>	

<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)</li> <li><input type="checkbox"/> Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)</li> <li><input type="checkbox"/> Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia</li> <li><input type="checkbox"/> Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)</li> <li><input type="checkbox"/> Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)</li> </ul>	



- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo

**Trattamenti**

- Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- Diarrea

**Fasi di sviluppo**

- Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)
- Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)
- Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)

**Nutrizione superiore al fabbisogno**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Alterato modello di sazietà (specificare)
- Riduzione dei sensi di gusto/olfatto

**Trattamenti**

- Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Rischio di aumento ponderale in gravidanza superiore a 12/13 Kg
- Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali

**Fasi di sviluppo**

- Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico

**Respirazione, inefficace funzionalità, rischio**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)
- X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)

**Trattamenti**

- Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)
- X Soppressione del riflesso della tosse
- X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)



**Situazionali (personali, ambientali)**

- Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)
- Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)

**Soffocamento, rischio**

Vedere rischio di lesione



**Stipsi**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)
- Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)
- Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)
- Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)
- Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare
- Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile
- Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)

**Trattamenti**

- Effetti collaterali di farmaci (specificare)
- Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica
- Uso abituale di lassativi
- Mucosite secondaria a radiazioni

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
- Modello di evacuazione irregolare
- Credenze culturali/sulla salute
- Mancanza di riservatezza
- X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
- Paura di dolore rettale o cardiaco
- Valutazioni errate
- X Incapacità di percepire i segnali intestinali

**Stress, sovraccarico psicofisico**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)
- Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra
- Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)
- Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali
- Perdite funzionali



<b>Trasloco, stress da</b>	<input type="checkbox"/>
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
<input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima)	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<input type="checkbox"/> Risorse economiche insufficienti	
<input type="checkbox"/> Elevati livelli di cambiamenti ( per ammissione in strutture residenziali/di assistenza)	
<input type="checkbox"/> Perdita di legami sociali/familiari	
<input type="checkbox"/> Abbandono	
<input type="checkbox"/> Modifica delle relazioni familiari	
<input type="checkbox"/> Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
<input type="checkbox"/> Bambino/adolescente: perdite associate al trasloco (paura di sentirsi rifiutato; perdita degli amici, problemi scolastici), insicurezze legate all'inserimento nel nuovo ambiente (nuovo gruppo, nuova scuola)	
<input type="checkbox"/> Persona anziana: necessità della vicinanza dei familiari per l'assistenza, ammissione in struttura di assistenza	
<b>Trasferimento, compromissione, rischio</b> Vedere mobilità, compromissione, rischio	<input type="checkbox"/>
<b>Trauma, rischio</b> Vedere rischio di lesione	<input type="checkbox"/>



**Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)





### Allegato 3

#### **PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI**

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per emorragia	<input type="checkbox"/>
RC per riduzione della gittata cardiaca	<input type="checkbox"/>
RC per aritmie	<input type="checkbox"/>
RC per edema polmonare	<input type="checkbox"/>
RC per trombosi venosa profonda	<input type="checkbox"/>
RC per ipovolemia	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome compartimentale	<input type="checkbox"/>
RC per embolia polmonare	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	<input type="checkbox"/>
RC per atelectasia/polmonite	<input type="checkbox"/>
RC per costrizione tracheobronchiale	<input type="checkbox"/>
RC per pneumotorace	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	<input type="checkbox"/>
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	<input type="checkbox"/>
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	<input type="checkbox"/>
RC per reazione allergica	<input type="checkbox"/>
Rc per trombocitopenia	<input type="checkbox"/>
RC per infezioni opportunistiche	<input type="checkbox"/>
RC per crisi falciforme	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	<input type="checkbox"/>
RC per insufficienza renale	<input type="checkbox"/>
RC per calcoli renali	<input type="checkbox"/>



<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per ipertensione endocranica	X
RC per crisi convulsiva	X
RC per ipertensione intraoculare	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome neurolettica maligna	<input type="checkbox"/>
RC per astinenza da alcol	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per ileo paralitico	<input type="checkbox"/>
RC per sanguinamento gastrointestinale	<input type="checkbox"/>
RC per disfunzione epatica	<input type="checkbox"/>
RC per iperbilirubinemia	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica</b>	
RC per fratture patologiche	X
RC per lussazione	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione riproduttiva</b>	
RC per sanguinamento genitale pretravaglio	<input type="checkbox"/>
RC per parto pretermine	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione gestazionale	<input type="checkbox"/>
RC per condizioni del feto non rassicuranti	<input type="checkbox"/>
RC per emorragia postpartum	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	<input type="checkbox"/>



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

Il modello organizzativo in uso è quello delle mini équipes, con riunioni multidisciplinari settimanali.

Nel servizio è frequentemente necessario condurre interventi educativi per le seguenti problematiche e tipologie di assistiti:

- con problematiche epilettiche;
- in terapia anticoagulante;
- con disfagia;
- portatori di tracheostomia;
- con deficit motori e cognitivi;
- che presentano incontinenza e/o ritenzione urinaria;
- con drenaggi liquorali e/o ematici.

Infatti vengono progettati e realizzati i seguenti interventi educativi:

- educazione della persona e del care giver all'assunzione del pasto per chi presenta problemi di disfagia e/o è portatore di tracheostomia;
- educazione della persona e del care giver alla mobilizzazione per chi presenta deficit motori;
- educazione della persona e del care giver all'autocateterismo;
- educazione della persona e del care giver alla mobilizzazione per chi è portatore di drenaggi liquorali e/o ematici.

In questo servizio si eseguono particolari esami diagnostici e trattamenti invasivi e non che richiedono una specifica attenzione, quali:

- angiografie e/o embolizzazioni per via angiografica;
- TAC e RMN con mezzo di contrasto e non;
- punture lombari diagnostiche e terapeutiche;
- trombolisi cerebrali;
- plasmaferesi terapeutiche;



- ☐ posizionamento di cateteri venosi centrali, P.E.G., tracheostomie;
- ☐ trasfusioni di emocomponenti;
- ☐ posizionamento di derivazioni liquorali;
- ☐ interventi neurochirurgici;
- ☐ esami batteriologici (emoculture, uroculture, colturale su broncoaspirato e liquor).

Esistono inoltre diversi protocolli aziendali in uso nel servizio:

- ☐ Assistenza al paziente nella fase perioperatoria;
- ☐ Assistenza perioperatoria al paziente operato di adenoma ipofisario;
- ☐ Medicazione della ferita chirurgica
- ☐ Gestione del catetere vescicale;
- ☐ Gestione del catetere venoso centrale;
- ☐ Gestione della cannula tracheostomica;
- ☐ Preparazione e posizionamento PEG;
- ☐ Esecuzione di esami batteriologici;
- ☐ Il buon uso del sangue;
- ☐ Gestione delle urgenze/emergenze
- ☐ Trasferimento e dimissione delle persone assistite
- ☐ Gestione dell'isolamento e delle infezioni nosocomiali
- ☐ Gestione del paziente diabetico
- ☐ Gestione delle lesioni da pressione
- ☐ Attività di badanza e visite parenti
- ☐ Attivazione della reperibilità
- ☐ Assistenza al paziente con ictus ischemico nella fase acuta (diagnosi, trattamento e riabilitazione)
- ☐ Gestione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente vittima di trauma
- ☐ Richiesta della teca cranica dalla banca dell'osso
- ☐ Trapianto di cellule staminali mesenchimali
- ☐ Trattamento delle crisi epilettiche e dello stato di male epilettico