



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome STEFANIA Cognome ROMEO Telefono 0114393480- 0114393447 e-mail stefania.romeo@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc	OSPEDALE MARIA VITTORIA, REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA, PALAZZINA "D" SECONDO PIANO
N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico,	18 POSTI LETTO, 9 CAMERE DI DEGENZA CON BAGNO IN CAMERA, 2 SALE DI MEDICAZIONE
Orari di lavoro,	MATTINO 7-14,42 POMERIGGIO 14,32-22,35 NOTTE 22,25-7,10
Figure professionali	COORDINATRICE, INFERMIERI, OSS, CHIRURGI ORL, SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
Risorse strumentali	AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRIA, AMBULATORIO DI AUDIOVESTIBOLOGIA
Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	LOCALE MENSA AZIENDALE FRUIBILE A PRANZO NON IN DIVISA ANCHE PER PASTI PORTATI DA CASA. ACCESSO INTERNET DISPONIBILE DAI PC IN REPARTO.
Contatti e riferimenti	Indirizzo VIA CIBRARIO 72, TORINO Telefono 0114393480- 0114393447 Fax 0114393403
Come raggiungere il servizio Mappa percorso	
Mezzi pubblici	16- 9- 13- 71- 59- 59/- 32- 3



--	--

Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati
Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cerebrovascolari

TERAPIA MEDICA PER SINDROME VERTIGINOSA,

Malattie Oncologiche

TUMORI DEL RINOFARINGE, LARINGE, CAVO ORALE, LINGUA, PAROTIDE, ADENOLINFOMI DEL COLLO

Malattie Osteoarticolari

OSTEOMIELITI DEL DISTRETTO CERVICO FACCIALE, MASTOIDITI, PATOLOGIE DELL'ORECHIO INTERNO

Malattie Respiratorie

POLIPOSI NASALI, SINUSITI COMPLICATE, TONSILLITI E ADENOTONSILLITI CON APNEE NOTTURNE



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpentito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Allattamento al seno, inefficace, interrotto

Fattori correlati

Fisiologici

Difficoltà del neonato ad attaccarsi al seno o succhiare il latte secondaria a :

- Retrazione dei capezzoli, inadeguato riflesso di eiezione del latte, stress
- Labio-palatoschisi
- Prematurità
- Pregresso intervento chirurgico al seno

Situazionali

- Fatigue, ansia, ambivalenza della madre
- Parto multiplo
- Inadeguata assunzione di nutrienti/liquidi
- Allattamento insoddisfacente
- Insufficiente sostegno di partner/familiari
- Insufficienti conoscenze
- Interruzione dell'allattamento per malattia della madre o del lattante
- Necessità di svezzare rapidamente il neonato
- Orario di lavoro e/o ostacoli nell'ambiente di lavoro
- Controindicazioni all'allattamento materno (es. farmaci, ittero da latte materno)

Alimentazione del bambino, inefficace modello di (dalla nascita ai 9 mesi)

Fattori correlati

Fisiopatologici

Aumento del fabbisogno calorico secondario a:

- Instabilità della temperatura corporea
- Tachipnea con aumento dello sforzo respiratorio
- Infezione
- Labioschisi e/o palatoschisi
- Sviluppo fisico
- Cicatrizzazione di ferite
- Scompenso o malattia degli organi vitali

Debolezza/ipotonia muscolare secondaria a

- Malnutrizione
- Prematurità
- Malattia acuta/cronica
- Letargia
- Difetti congeniti
- Scompenso o malattia di organi vitali



- Ritardo/compromissione neurologica
- Iperbilirubinemia

Trattamenti

- Stato ipermetabolico (intervento chirurgico, procedure dolorose)
- Debolezza muscolare (farmaci, deprivazione del sonno)
- Ipersensibilità orale
- Precedente digiuno prolungato

Situazionali

- Incongruenze fra i caregiver (che provvedono all'alimentazione)
- Mancanza di conoscenze o di impegno da parte dei caregiver in rapporto a regime dietetico o a bisogni alimentari
- Presenza di stimoli orali o facciali nocivi e/o assenza di stimoli orali
- Inadeguata produzione di latte materno

Ansia



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza

Situazionali (personali, ambientali)

X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)

- Perdita reale o percepita di persone significative

X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)

X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)

X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto
- Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei
- Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio
- X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento

Aspirazione, rischio di



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)
- Depressione dei riflesso della tosse/faringeo
- Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)
- Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)

X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)



- X Fistola tracheo-esofagea
- X Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)

Trattamenti

- X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)
- X Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)

Situazionali (personali, ambientali)

- Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo
- Assunzione di alimenti in corso di intossicazione

Fasi di sviluppo

- Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione
- Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore
- Persona anziana: dentizione inadeguata

Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di



Fattori correlati

Fisiopatologici

Interruzione del processo di attaccamento per

- Malattia del genitore/ del bambino

Trattamenti

Barriere all'attaccamento secondarie a

- Mancanza di riservatezza
- Apparecchiature, monitoraggio intensivo
- Limitazione dei visitatori, visite rigidamente strutturate

Situazionali (personali, ambientali)

- Aspettative non realistiche (nei confronti del bambino, di se stessi)
- Gravidanza indesiderata
- Delusione nei confronti del bambino (es. per il sesso, per l'aspetto)
- Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, abuso di sostanze, difficoltà economiche, malattia mentale)
- Scarsa conoscenza e/o disponibilità dei modelli di ruolo genitoriale
- Disabilità fisica del genitore (es. cecità, paralisi, sordità)
- Inadeguata preparazione emotiva dovuta a nascita prematura del bambino

Attività, intolleranza all'attività



Fattori correlati

Fisiopatologici

Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per

- Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)
- X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare)
- Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)

Aumento del fabbisogno metabolico per

- X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)
- Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)
- X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)

Trattamenti

- X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)
- X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)
- X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori,



stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)

- Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)

Fasi di sviluppo

- Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali

Autolesionismo, automutilazione, rischio di



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale)

Personalì

- Pregressi episodi di autolesionismo
- Abusi fisici, psichici, o sessuali
- Inefficaci capacità di coping
- X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti

Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: correlati all'abuso

Autostima, Disturbo/Rischio di



Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)
- X Deturpazione

- Squilibri biochimici, neurofisiologici

Situazionali (personalì, ambientali)

- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)

X Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)

- Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità
- Insuccesso scolastico
- Relazione inefficace con i propri genitori
- Relazioni abusive
- Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli
- Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione
- Storia di numerosi insuccessi

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone
- Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi)
- Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative
- Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento
- Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento

Avvelenamento, rischio





Vedere lesione, rischio

Cadute, rischio
Vedere lesione, rischio

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di

Fattori correlati
Fisiopatologici
X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)
Trattamenti
X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)
Situazionali (personali, ambientali)

- Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver
- Modello di coping inefficace
- X Salute fisica compromessa
- Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
- X Durata dell'assistenza richiesta
- Isolamento
- X Pause di riposo/svago insufficienti o
- X Risorse economiche insufficienti
- Assenza o non disponibilità di sostegno

Fasi di sviluppo

- Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)

Casa, compromessa gestione

Fattori correlati
Fisiopatologici
X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare)
Situazionali (personali, ambientali)
X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.
X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno

- Perdita di un familiare
- Deficit di conoscenze
- X Insufficienza di risorse economiche

Fasi di sviluppo

- Bambino (correlata all'esigenza di cure molteplici)
- Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)

Comunicazione, compromissione e
Comunicazione verbale, compromissione
(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)

Fattori correlati



Fisiopatologici

- Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia
- Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio
- Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale).
- Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)
- Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)

Trattamenti

- Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)
- Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- Mancanza di riservatezza
- Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

Fasi di sviluppo

- Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale)
- Persona anziana (perdite uditive)
- Compromissione cognitiva per (specificare patologia)

Concetto di se, disturbo del



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

Situazionali (personali, ambientali)

- Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa
- Immobilità o perdita di funzioni
- Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali
- Preferenze sessuali
- Gravidanza nel corso dell'adolescenza
- Differenza di sesso nell'educazione dei figli
- Esperienze di violenza da parte dei genitori
- Cambiamento del consueto modello di responsabilità

Fasi di sviluppo

- Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)
- Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)

Confusione mentale acuta



Fattori correlati

Fattori di rischio

- Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per
- Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)
- Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)



- Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)
- X Disturbi respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)
- X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)
- X Disturbi metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)
- Disturbi del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)

Trattamenti

X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenintoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.
- X Dolore, fecaloma, immobilità,
- Depressione, situazioni non familiari
- Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)

Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Presenza di batteri, virus, tossine
- Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)
- Stati patologici pre-esistenti
- Genere
- Storia di fumo

Trattamenti

- Vaccinazioni recenti
- Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione
- Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati

Situazionali (personali, ambientali)

- Alluvioni, terremoti, disastri naturali.
- Perdite rete fognaria
- Emissioni da impianti industriali:scarichi intenzionali o accidentali di contaminanti da locali commerciali o industriali, inquinamento delle falde acquifere
- Fattori fisici:condizioni climatiche, area geografica
- Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria
- Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori)
- Bioterrorismo

X Tipo di lavoro

- Pratiche dietetiche
- Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche
- Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni

Fasi di sviluppo

- Caratteristiche evolutive dei bambini
- Bambini di età inferiore a 5 anni
- Persone anziane
- Età gestazionale durante l'esposizione



Coping inadeguato della famiglia



Fattori correlati

Biofisiopatologici

X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

Situazionali (personali, ambientali)

- Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)
- Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli
- Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori
- Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli

Coping inefficace



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

Trattamenti

- Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- Disorganizzazione del sistema familiare
- Inefficace capacità di problem solving
- Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress
- Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)
- Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)
- Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche



Cura di sé, deficit (alimentazione)	<input type="checkbox"/>
Incapacità di (specificare):	
<input type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni <input type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca	
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici	
Trattamenti	
<input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza	
Fasi di sviluppo	
<input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)	<input type="checkbox"/>
Ridotta e/o incapacità di (specificare):	
<input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)	



- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

Trattamenti

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- Deficit cognitivi
- X Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- Confusione mentale
- Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)

Ridotta e/o incapacità di (specificare):

- X mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti
- X curare il proprio aspetto
- X acquistare o cambiare capi di vestiario
- o il flusso dell'acqua
- percepire il bisogno di cure igieniche



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- X Deficit somatici

Trattamenti

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- Deficit cognitivi
- X Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- Confusione mentale
- Ansia che paralizza



Fasi di sviluppo

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)

Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):

X servirsi del gabinetto/comoda

- trasferirsi sul gabinetto/comoda

X eseguire pratiche igieniche adeguate

- pulire il gabinetto o la comoda

X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

Trattamenti

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori**

Situazionali (personali, ambientali)

- Deficit cognitivi
- X Dolore**
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- Confusione mentale
- Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (strumentale)

Difficoltà a (specificare)

X usare il telefono

- accedere ai mezzi di trasporto
- lavare e stirare
- preparare i pasti
- X fare la spesa**
- gestire il denaro
- assumere i farmaci



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)



- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatiformi

Trattamenti

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori

Situazionali (personali, ambientali)

- Deficit cognitivi
- Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- Confusione mentale
- Ansia che paralizza

Fasi di sviluppo

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Deambulazione, compromissione, rischio

Vedere mobilità, compromissione, rischio



Deglutizione, compromissione



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)
- Tumore / edema tracheo-esofageo
- Irritazione della cavità orofaringea
- Diminuzione della salivazione

Trattamenti

- Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso
- Riduzione della coscienza per anestesia
- Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica
- Esofagite da radioterapia

Situazionali (personali, ambientali)

- Alterazione del livello di coscienza
- Fatigue

Fasi di sviluppo

- Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione
- Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)



Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del



midollo spinale)

- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)

XCancro

XDisordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)

XInfiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.

XFatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)

XEffetti di un tumore su (specificare)

XDolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.

- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

XTrauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva

XPer nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

XFebbre

XImmobilità/posizionamento inappropriato

- Iperattività
- XPunti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- XBisogno di dipendenza non soddisfatto
- XAnsia grave e repressa

Fasi di sviluppo

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- 1 anno: coliche
- Prima infanzia: dentizione, otalgia
- Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
- Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)



Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
 - Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- XCancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- XInfiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- XFatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
 - Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
 - Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
 - Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

XTrauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva

XPer nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

XFebbre

XImmobilità/posizionamento inappropriato

- Iperattività
- Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)



- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

Eliminazione urinaria compromessa

Per Incontinenza urinaria (specificare):

- Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)
- Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)
- Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)
Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)
- Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)
- Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)
- Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

Trattamenti

- Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)

Eminegligenza

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale

Fatigue

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)
- Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)
- Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)
- Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS)
- XStato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore
- XDeficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)
- Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)

Trattamenti

XModificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,

- Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)



Situazionali (personali, ambientali)

XDiminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)

- Eccessive richieste di ruolo
- Richieste emozionali soverchianti

XStress emotivo

XDisturbi del sonno

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di



Fattori correlati

Fisiopatologici

XVariazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento

Trattamenti

Xvariazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)

Situazionali (personali, ambientali)

- Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)
- Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)

Immobilizzazione, sindrome da



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Riduzione del sensorio
 - Stato di incoscienza
 - Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)
 - Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)
 - Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)
- XCancro

Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)

Trattamenti

- XIntervento chirurgico
- Ventilazione meccanica
- XLinee venose
- Trazione/gesso/tutore ortopedico
- Immobilità prescritta

Situazionali (personali, ambientali)

- Depressione
- XFatigue
- Stato di debilitazione
- XDolore

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida
- Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile

Incontinenza fecale



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)



<input type="checkbox"/> Compromissione delle funzioni cognitive <input type="checkbox"/> Iperdistensione rettale per stipsi cronica <input type="checkbox"/> Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) <input type="checkbox"/> Trattamenti <input type="checkbox"/> Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni. Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

Incontinenza urinaria da sforzo	<input type="checkbox"/>
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale <input type="checkbox"/> Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana: perdita di tono muscolare 	
Incontinenza urinaria da urgenza	<input type="checkbox"/>
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale, <input type="checkbox"/> Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino: limitata capacità vescicale <input type="checkbox"/> Persona anziana: diminuita capacità vescicale 	

Incontinenza urinaria funzionale	<input type="checkbox"/>
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della mobilità <input type="checkbox"/> Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, 	



confusione mentale

- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)

Fasi di sviluppo

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria
- Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

Trattamenti

- Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- Strumentazione diagnostica
- Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorelassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)

Situazionali (personali, ambientali)

- Compromissione della mobilità
- Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

Fasi di sviluppo

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

, rischio di Infezione





Fattori correlati

Fisiopatologici

- XCompromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)
- XCompromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica

Trattamenti

- XSede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale
- XCompromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

XCompromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità

- Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio)
- gessato, pieghe cutanee)
- XContatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)

Fasi di sviluppo

- Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circonscisione), sistema immunitario immaturo
- Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali
- Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)

Insonnia



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori,arteriosclerosi periferica)
- XCompromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)
- Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)

Situazionali (personali, ambientali)

- Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)
- Eccessivo dormire di giorno
- XDepressione
- XInadeguata attività fisica durante il giorno
- XDolore cronico
- XRisposte ansiose
- Modifiche ambientali (specificare)
- XPaura
- Frequenti risvegli dei bambini
- Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)

Integrità cutanea/tissutale:compromissione, rischio



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia,.



Integrità mucosa orale, compromissione	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> XInadeguata igiene orale XIncapacità di provvedere all'igiene orale 	
Ipertermia	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco) <p>Situazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esposizione al calore, al sole <input type="checkbox"/> Abbigliamento inadeguato al clima XAssenza di condizionamento dell'aria <input type="checkbox"/> Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero <input type="checkbox"/> Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione) <input type="checkbox"/> Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età 	
Ipotermia	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento <input type="checkbox"/> Vestiario inadatto al clima <input type="checkbox"/> Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento <input type="checkbox"/> Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano) 	
Lesione, rischio di	<input type="checkbox"/>
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini,sincope) <input type="checkbox"/> Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) XFatigue <input type="checkbox"/> Ipotensione ortostatica <input type="checkbox"/> Insufficienza vertebro basilare X Disturbi vestibolari <input type="checkbox"/> Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <input type="checkbox"/> Movimenti tonico-clonici (convulsioni) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> XLungo allettamento <input type="checkbox"/> Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare) <input type="checkbox"/> Gesso, stampelle, deambulatore, bastone <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione o perdita memoria a breve termine 	



- Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)
- Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)
- Pericolo di incendio
- Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- Scarpe inadatte,
- Disattenzione del caregiver
- Uso improprio degli ausili
- Storia di incidenti
- Andatura instabile

Fasi di sviluppo

- Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli
- Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione)
- Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi)
- Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento
- Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite)

Trattamenti

- Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia
- Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore
- Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento

Situazionali (personali, ambientali)

- Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano)

Fasi di sviluppo

- Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata)

Liquidi, eccessivo volume di



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

XRitenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea)

- Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

Situazionali (personali, ambientali)



- Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- XInadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- XRistagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)
- Compromissione venosa da utero gravido

Fasi di sviluppo

- Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

Liquidi, insufficiente volume di



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

Situazionali (personali, ambientali)

- XVomito/nausea
- XDiminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- XDieta scorretta/digiuno
- XNutrizione per sonda con soluzione concentrata
- XDifficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)

- Esposizione a climi estremi
- Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
- Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

Fasi di sviluppo

- Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

Memoria, compromissione



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
- Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
- Deficienze nutrizionali

Trattamenti

- Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni

Situazionali (personali, ambientali)

- Aspettative che si auto realizzano
- Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- Consumo di alcol
- Mancanza di motivazione
- Inadeguata stimolazione



- Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)

Mobilità, compromissione /rischio di



Fattori correlati

Fisiopatologici

Xriduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)

- riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)

- edemi

Xapparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)

- forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

Situazionali (personali, ambientali)

Xfatigue

- obesità

- mancanza di motivazione

Xdispnea

Xdolore

Fasi di sviluppo

- Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite

- Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio

Vedere mobilità, compromissione, rischio



Nausea



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)

Trattamenti

Effetti della chemioterapia e/o farmaci

XEffetti dell'anestesia

Non adesione (a indicazioni terapeutiche)



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)

- Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato

Trattamenti



- Effetti collaterali della terapia
- Ambiente non terapeutico
- Terapia complessa non controllata/prolungata
- Costo economico della terapia
- Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace
- Processo di presa in carico impersonale (multi professionale)

Situazionali (personali, ambientali)

- Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)
- Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- Modificazione dello stato lavorativo
- Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie
- Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di



Fattori correlati

Fisiopatologici

X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)

X Disfagia (per ictus cerebrale, M. di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciali, SLA, disturbi neuromuscolari)

- Diminuito assorbimento di nutrienti (per M. di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)

X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)

- Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo

Trattamenti

- Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)

- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)

X Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- Diarrea

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)



- Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza la lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)
- Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)

Nutrizione superiore al fabbisogno

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Alterato modello di sazietà (specificare)
- Riduzione dei sensi di gusto/olfatto

Trattamenti

- Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)

Situazionali (personali, ambientali)

- Rischio di aumento ponderale in gravidanza superiore a 12/13 Kg
- Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali

Fasi di sviluppo

- Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico

Respirazione, inefficace funzionalità, rischio

Fattori correlati

Fisiopatologici

- XSecrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)
- XImmobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)

Trattamenti

- Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)
- Soppressione del riflesso della tosse
- XEffetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)

Situazionali (personali, ambientali)

- XImmobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)
- Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)

Soffocamento, rischio

Vedere rischio di lesione

Stipsi

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)
- Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)
- Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)
- Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)
- Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare
- Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile
- Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali)



multipli, sforzo cronico)

Trattamenti

- Effetti collaterali di farmaci (specificare)
- Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica
- Uso abituale di lassativi
- Mucosite secondaria a radiazioni

Situazionali (personali, ambientali)

XDiminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)

- Modello di evacuazione irregolare
- Credenze culturali/sulla salute
- XMancanza di riservatezza
- XDieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
- Paura di dolore rettale o cardiaco
- Valutazioni errate
- Incapacità di percepire i segnali intestinali

Stress, sovraccarico psicofisico



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

Situazionali (personali, ambientali)

- Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)
- Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra
- Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)
- Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali
- Perdite funzionali

Trasloco, stress da



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima)

Situazionali (personali, ambientali)

- Risorse economiche insufficienti
- Elevati livelli di cambiamenti (per ammissione in strutture residenziali/di assistenza)
- Perdita di legami sociali/familiari
- Abbandono
- Modifica delle relazioni familiari
- Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento

Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: perdite associate al trasloco (paura di sentirsi rifiutato; perdita degli amici, problemi scolastici), insicurezze legate all'inserimento nel nuovo ambiente (nuovo gruppo, nuova scuola)
- Persona anziana: necessità della vicinanza dei familiari per l'assistenza, ammissione in struttura di assistenza

Trasferimento, compromissione, rischio



Verdere mobilità, compromissione, rischio



Trauma, rischio
Vedere rischio di lesione



Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X <input type="checkbox"/>
RC per riduzione della gittata cardiaca	<input type="checkbox"/>
RC per aritmie	<input type="checkbox"/>
RC per edema polmonare	<input type="checkbox"/>
RC per trombosi venosa profonda	X <input type="checkbox"/>
RC per ipovolemia	X <input type="checkbox"/>
RC per sindrome compartimentale	<input type="checkbox"/>
RC per embolia polmonare	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	<input type="checkbox"/>
RC per atelectasia/polmonite	<input type="checkbox"/>
RC per costrizione tracheobronchiale	X <input type="checkbox"/>
RC per pneumotorace	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	<input type="checkbox"/>
RC per bilancio azotato negativo	<input type="checkbox"/>
RC per squilibri elettrolitici	<input type="checkbox"/>
RC per sepsi	X <input type="checkbox"/>
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	<input type="checkbox"/>
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	<input type="checkbox"/>
RC per reazione allergica	<input type="checkbox"/>
Rc per trombocitopenia	<input type="checkbox"/>
RC per infezioni opportunistiche	<input type="checkbox"/>
RC per crisi falciforme	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	<input type="checkbox"/>
RC per insufficienza renale	<input type="checkbox"/>
RC per calcoli renali	<input type="checkbox"/>



Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per ipertensione endocranica	<input type="checkbox"/>
RC per crisi convulsiva	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione intraoculare	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome neurolettica maligna	<input type="checkbox"/>
RC per astinenza da alcol	X <input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	<input type="checkbox"/>
RC per sanguinamento gastrointestinale	<input type="checkbox"/>
RC per disfunzione epatica	<input type="checkbox"/>
RC per iperbilirubinemia	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	<input type="checkbox"/>
RC per lussazione	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione riproduttiva	
RC per sanguinamento genitale pretravaglio	<input type="checkbox"/>
RC per parto pretermine	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione gestazionale	<input type="checkbox"/>
RC per condizioni del feto non rassicuranti	<input type="checkbox"/>
RC per emorragia postpartum	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	<input type="checkbox"/>



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA PER COMPITI

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE: 2/3 INFERMIERI NEL TURNO DEL MATTINO E 2/3 OSS, 2 INFERMIERI DI POMERIGGIO E 2 OSS, 2 INFERMIERI DI NOTTE.

PAZIENTI PROVENIENTI DAL DEA PER TERAPIA MEDICA IN FASE ACUTA.

RICOVERI PROGRAMMATI PER INTERVENTI DI CHIRURGIA MINORE SVOLTI IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO, ONE DAY SURGERY E DAY SURGERY SU PAZIENTI ADULTI ED IN ETA' PEDIATRICA (>3 ANNI).

RICOVERI ORDINARI PER CHIRURGIA ONCOLOGICA MAGGIORE ADULTI E PEDIATRICA.

GESTIONE DEL PRE E POST OPERATORIO, MEDICAZIONI SITO CHIRURGICO, DIETE PER OS,

ALIMENTAZIONE VIA PEG E SNG.

GESTIONE DELLA TRACHEOSTOMIA, RICONOSCENDO USI E FUNZIONI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CANNULE TRACHEALI E BRONCOASPIRAZIONE.

EDUCAZIONE TERAPEUTICA ALLA GESTIONE DOMICILIARE DELLA TRACHEOSTOMIA DI PAZIENTI IN DIMISSIONE.

ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO IN REPARTO DURANTE GLI ORARI E GIORNI DI CHIUSURA DELL'AMBULATORIO.

ASSISTENZA E CONTROLLO DELL'EPISTASSI ANTERIORE O POSTERIORE IN PAZIENTI PROVENIENTI DAL



DEA, SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON IL MEDICO OTORINOLARINGOIATRA.

DIAGNOSI DELLE SINDROMI DA APNEE NOTTURNE (OSAS) ATTRAVERSO ESAME DIAGNOSTICO DI
POLISONNOGRAFIA AD 8 CANALI POSIZIONATA DA 2 REFERENTI INFERMIERISTICI

USO DEI FERRI CHIRURGICI E DEGLI STRUMENTI A FIBRE OTTICHE CARATTERIZZANTI LA SPECIALITA'
OTORINOLARINGOIATRICA, CON RELATIVA DECONTAMINAZIONE, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE.

USO DPI.

UTILIZZO E COMPrensIONE DELLA SCHEDA UNICA DI TERAPIA, RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI,
COMPILAZIONE SCHEDA REGIONALE DI RILEVAZIONE DEL DOLORE.

PER GLI STUDENTI DEL TERZO ANNO PERCORSO PRESSO L'AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRIA:

VISITE AMBULATORIALI SU PRENOTAZIONE O DI PAZIENTI PROVENIENTI DAL PRONTO SOCCORSO,
MODALITA' DI PRE RICOVERO, VISITE DI CONTROLLO POST INTERVENTO, FOLLOW UP DEL PAZIENTE
ONCOLOGICO.

POSSIBILITA' DI OSSERVARE L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI SVOLTI DAL TECNICO
AUDIOMETRISTA DELL'AMBULATORIO DI AUDIOVESTIBOLOGIA.



A.S.L. TO 2
Azienda Sanitaria Locale
Torino

Corso di Laurea delle Professioni sanitarie
Corso di Laurea in Infermieristica
Sede TO2



Università degli Studi di Torino
Scuola di Medicina

