



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>ILEANA CORREGGIA 011/2402862 – 2006 – 2803 – 2376 – 2003 ileana.correggia@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p>PRONTO SOCCORSO - situato al Piano Terra (ala nuova) del p.o. S. Giovanni Bosco</p> <p>CONTESTO ASSISTENZIALE DI APPRENDIMENTO La struttura complessa è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 postazioni di triage • 6 posti letto di semi-intensiva di cui 4 predisposte per la ventilazione invasiva e non. • 33 posti letti di degenza temporanea • 1 posto letto in isolamento • 5 sale visita • 1 sala sutura <p>ORARI DI SERVIZIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mattino: 7 – 14.42 • Pomeriggio: 14.32 – 22.35 • Notte: 22.25 – 7.10 <p>ORARI DI VISITA IN REPARTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mattino: 12 – 13 • Pomeriggio: 19 – 20 <p>EQUIPE DI LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Direttore di struttura complessa per il Pronto Soccorso • Dirigenti medici strutturati • Dir. medici di chirurgia generale che svolgono attività di pronto soccorso • Specializzandi medici • Dir. medici di ortopedia che svolgono attività di pronto soccorso h 12 • Dirigenti medici di medicina generale • Dirigenti medici specialisti in consulenza • 2 Coordinatori infermieristici • Infermieri dipendenti aziendali, infermieri liberi professionisti, infermieri dipendenti di agenzia di somministrazione di lavoro • Operatori Socio Sanitari (OSS) sia dipendenti aziendali che dipendenti della cooperativa • Operatori tecnici sanitari • 3 Amministrativi



<p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none">• Farmacisti• Assistenti sociali• Infermieri del servizio dialisi• Tecnici di radiologia• Dietisti• Logopedisti <p>RISORSE STRUMENTALI</p> <ul style="list-style-type: none">• 13 Monitor• 3 Defibrillatori di cui 2 bifasici e 1 monofasico• 1 Pulsiossimetri• 8 Apparecchi per la rilevazione dei parametri• 4 Ventilatori• Ambu con maschere• 3 Elettrocardiografi• 1 Ecografo• Pompe infusionali volumetriche e siringa• Presidi d'immobilizzazione della colonna e degli arti• 1 Apparecchio per il raffreddamento/riscaldamento della temperatura corporea• 1 Apparecchio per il riscaldamento dei fluidi da infondere• 1 Contenitore scalda fluidi / lenzuola• MAD (materasso antidecubito) a richiesta• 1 Macchina per esecuzione EGA• 2 Trazioni transcheletriche per stabilizzazione fratture (Zuppinger)• Ferule con pesi• 1 Set per toracotomia• 1 Set per tracheotomia d'urgenza• 1 Set Ortopedico• 1 Set Chirurgia Vascolare• Ferri chirurgici• 1 Set per intubazione difficile• Sistema di interfono• 14 Computer <p>SERVIZI AGLI STUDENTI</p> <ul style="list-style-type: none">• Mensa aziendale• Computer con accesso ad internet <p>Indirizzo: Piazza Donatori di Sangue 3, Torino Telefono 011/2402862 – 2006 – 2803 – 2376 – 2003 Fax: 011/2402302 e-mail</p> <p>Mezzi pubblici: 4 – 2 – 50</p>
--	--



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Traumatologiche / incidenti	X
<ul style="list-style-type: none">• Patologie dell'apparato cardiovascolare (angine, IMA, scompenso cardiaco, ACC, BAV, FA, TPSV, TV, ischemie, aneurismi)• Patologie dell'apparato respiratorio (BPCO, polmoniti, TEP, EPA, Pneumotorace, neoplasie)• Patologie di origine neurologica (ICTUS, TIA, patologie degenerative, neoplasie)• Patologie di origine neurochirurgica (MAV, emorragie, ernie discali)• Patologie dell'apparato gastrointestinale (emorragie, neoplasie, processi infiammatori, calcoli, patologiche che necessita di intervento chirurgico urgente)• Patologie dell'apparato urinario (processi infiammatori, calcolosi, emorragie, neoplasie, patologie che necessitano di intervento chirurgico urgente)• Piccoli e grandi traumi (contusioni, infortuni sul lavoro, ustioni, fratture, traumi distorsivi, amputazioni, emorragie)• Malattie infettive infettive (Clostridium pos, meningiti batteriche e virali, TBC)• Stati di shock• Reazioni allergiche• Stato di coma• Intossicazioni• Malattie metaboliche (Diabete, tiroiditi, rabdomiolisi, Scompenso metabolici)• Psicosi acute e tentativi anticonservativi, sindromi da astinenza	



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)	
<input type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative	
<input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)	
<input type="checkbox"/> Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)	
<input type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)	
Fasi di sviluppo	
<input type="checkbox"/> Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto	
<input type="checkbox"/> Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei	
<input type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio	
<input type="checkbox"/> Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

Aspirazione, rischio di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input type="checkbox"/> Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)	
<input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi della tosse/faringeo	
<input type="checkbox"/> Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)	
<input type="checkbox"/> Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)	
<input type="checkbox"/> Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)	
<input type="checkbox"/> Fistola tracheo-esofagea	
<input type="checkbox"/> Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)	
Trattamenti	
<input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)	
<input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)	
Situazionali (personali, ambientali)	



Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo

Assunzione di alimenti in corso di intossicazione

Fasi di sviluppo

Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione

Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore

Persona anziana: dentizione inadeguata

Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Interruzione del processo di attaccamento per

Malattia del genitore/ del bambino

Trattamenti

Barriere all'attaccamento secondarie a

Mancanza di riservatezza

Apparecchiature, monitoraggio intensivo

Limitazione dei visitatori, visite rigidamente strutturate

Situazionali (personali, ambientali)

Aspettative non realistiche (nei confronti del bambino, di se stessi)

Gravidanza indesiderata

Delusione nei confronti del bambino (es. per il sesso, per l'aspetto)

Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, abuso di sostanze, difficoltà economiche, malattia mentale)

Scarsa conoscenza e/o disponibilità dei modelli di ruolo genitoriale

Disabilità fisica del genitore (es. cecità, paralisi, sordità)

Inadeguata preparazione emotiva dovuta a nascita prematura del bambino

Attività, intolleranza all'attività

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per

Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)

Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopulmonare)

Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)

Aumento del fabbisogno metabolico per

Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)

Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)

Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)

Trattamenti

Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)

Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto)

Situazionali (personali, ambientali)

Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario,insufficiente conoscenza)

Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)

Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)



Fasi di sviluppo

- Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali

Autolesionismo, automutilazione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale)

Personali

- Pregressi episodi di autolesionismo
- Abusi fisici, psichici, o sessuali
- Inefficaci capacità di coping
- Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti

Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: correlati all'abuso

Autostima, Disturbo/Rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)
- Deturpazione
- Squilibri biochimici, neurofisiologici

Situazionali (personali, ambientali)

- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)
- Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)
- Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità
- Insuccesso scolastico
- Relazione inefficace con i propri genitori
- Relazioni abusive
- Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli
- Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione
- Storia di numerosi insuccessi

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone
- Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi
- Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative
- Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento
- Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento

Avvelenamento, rischio

Vedere lesione, rischio

X



Cadute, rischio Vedere lesione, rischio	X
---	---

Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
---	---

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia <input type="checkbox"/> Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio <input type="checkbox"/> Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale). <input type="checkbox"/> Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) <input type="checkbox"/> Paralisi delle corde vocali, tetraplegia <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) <input type="checkbox"/> Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento <input type="checkbox"/> Barriere psicologiche (paura, timidezza) <input type="checkbox"/> Mancanza di riservatezza <input type="checkbox"/> Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale) <input type="checkbox"/> Persona anziana (perdite uditive) <input type="checkbox"/> Compromissione cognitiva per (specificare patologia) 	X
---	---

Concetto di se, disturbo del	X
-------------------------------------	---

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa <input type="checkbox"/> Immobilità o perdita di funzioni <input type="checkbox"/> Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali <input type="checkbox"/> Preferenze sessuali <input type="checkbox"/> Gravidanza nel corso dell'adolescenza <input type="checkbox"/> Differenza di sesso nell'educazione dei figli <input type="checkbox"/> Esperienze di violenza da parte dei genitori <input type="checkbox"/> Cambiamento del consueto modello di responsabilità <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità) <input type="checkbox"/> Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità) 	X
---	---



Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/ipernatremia, ipo/iperglicemia) <input type="checkbox"/> Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio) <input type="checkbox"/> Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale) <input type="checkbox"/> Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) <input type="checkbox"/> Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) <input type="checkbox"/> Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale) <input type="checkbox"/> Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio. <input type="checkbox"/> Dolore, fecaloma, immobilità, <input type="checkbox"/> Depressione, situazioni non familiari <input type="checkbox"/> Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...) 	

Coping inadeguato della famiglia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori <input type="checkbox"/> Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli 	

Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) <input type="checkbox"/> Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale) <input type="checkbox"/> Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione) <input type="checkbox"/> Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) 	



Trattamenti

- Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- Disorganizzazione del sistema familiare
- Inefficace capacità di problem solving
- Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress
- Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)
- Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)
- Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

Cura di sé, deficit (alimentazione)

Incapacità di (specificare):

- tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- portare il cibo alla bocca

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare)
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

Trattamenti

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)



<input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	X
---	----------

Fattori correlati Fisiopatologici <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici Trattamenti <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--



<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) 	



<input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici Trattamenti <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--

Deglutizione, compromissione	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input type="checkbox"/> Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) <input type="checkbox"/> Tumore / edema tracheo-esofageo <input type="checkbox"/> Irritazione della cavità orofaringea <input type="checkbox"/> Diminuzione della salivazione Trattamenti <input type="checkbox"/> Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso <input type="checkbox"/> Riduzione della coscienza per anestesia <input type="checkbox"/> Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <input type="checkbox"/> Esofagite da radioterapia Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> Alterazione del livello di coscienza <input type="checkbox"/> Fatigue Fasi di sviluppo <input type="checkbox"/> Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione <input type="checkbox"/> Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto	

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
Fattori correlati Fisiopatologici Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a <input type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) <input type="checkbox"/> Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) <input type="checkbox"/> Cancro	



- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- Febbre
- Immobilità/posizionamento inappropriato
- Iperattività
- Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

Fasi di sviluppo

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- 1 anno: coliche
- Prima infanzia: dentizione, otalgia
- Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
- Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- Febbre
- Immobilità/posizionamento inappropriato



- Iperattività
- Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

Eliminazione urinaria compromessa

Per Incontinenza urinaria (specificare):

X

- Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)
- Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)
- Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)
- Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)
- Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)
- Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)
- Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

Trattamenti

- Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)

Fatigue

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)
- Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)
- Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)
- Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla., SLA, M. Parkinson, AIDS)
- Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore
- Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)
- Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)

Trattamenti

- Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,
- Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)
- Eccessive richieste di ruolo



- Richieste emozionali soverchianti
- Stress emotivo
- Disturbi del sonno

Immobilizzazione, sindrome da

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Riduzione del sensorio
- Stato di incoscienza
- Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)
- Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)
- Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)
- Cancro

Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)

Trattamenti

- Intervento chirurgico
- Ventilazione meccanica
- Linee venose
- Trazione/gesso/tutore ortopedico
- Immobilità prescritta

Situazionali (personali, ambientali)

- Depressione
- Fatigue
- Stato di debilitazione
- Dolore

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida
- Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile

Incontinenza fecale

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)
- Compromissione delle funzioni cognitive
- Iperdistensione rettale per stipsi cronica
- Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)
- Trattamenti
- Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.

Situazionali (personali, ambientali)

- Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)



Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della mobilità <input type="checkbox"/> Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <input type="checkbox"/> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria <input type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva <input type="checkbox"/> Strumentazione diagnostica <input type="checkbox"/> Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della mobilità <input type="checkbox"/> Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <input type="checkbox"/> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	



Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) <input type="checkbox"/> Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità <input type="checkbox"/> Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio) <input type="checkbox"/> gessato, pieghe cutanee) <input type="checkbox"/> Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circonscisione), sistema immunitario immaturo <input type="checkbox"/> Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali <input type="checkbox"/> Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	

Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica) <input type="checkbox"/> Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria) <input type="checkbox"/> Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) <input type="checkbox"/> Eccessivo dormire di giorno <input type="checkbox"/> Depressione <input type="checkbox"/> Inadeguata attività fisica durante il giorno <input type="checkbox"/> Dolore cronico <input type="checkbox"/> Risposte ansiose <input type="checkbox"/> Modifiche ambientali (specificare) <input type="checkbox"/> Paura <input type="checkbox"/> Frequenti risvegli dei bambini <input type="checkbox"/> Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa) 	



Integrità mucosa orale, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inadeguata igiene orale <input type="checkbox"/> Incapacità di provvedere all'igiene orale 	
Ipertermia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco) <p>Situazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esposizione al calore, al sole <input type="checkbox"/> Abbigliamento inadeguato al clima <input type="checkbox"/> Assenza di condizionamento dell'aria <input type="checkbox"/> Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero <input type="checkbox"/> Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione) <input type="checkbox"/> Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età 	
Ipotermia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento <input type="checkbox"/> Vestiario inadatto al clima <input type="checkbox"/> Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento <input type="checkbox"/> Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano) 	
Lesione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope) <input type="checkbox"/> Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) <input type="checkbox"/> Fatigue <input type="checkbox"/> Ipotensione ortostatica <input type="checkbox"/> Insufficienza vertebro basilare <input type="checkbox"/> Disturbi vestibolari <input type="checkbox"/> Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <input type="checkbox"/> Movimenti tonico-clonici (convulsioni) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lungo allettamento <input type="checkbox"/> Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare) <input type="checkbox"/> Gesso, stampelle, deambulatore, bastone 	



Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)
- Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)
- Pericolo di incendio
- Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- Scarpe inadatte,
- Disattenzione del caregiver
- Uso improprio degli ausili
- Storia di incidenti
- Andatura instabile

Fasi di sviluppo

- Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli
- Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

Liquidi, eccessivo volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoeidema)
- Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

- Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea)
- Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)
- Compromissione venosa da utero gravido

Fasi di sviluppo

- Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

Liquidi, insufficiente volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

Situazionali (personali, ambientali)

- Vomito/nausea



- Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- Dieta scorretta/digiuno
- Nutrizione per sonda con soluzione concentrata
- Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
- Esposizione a climi estremi
- Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
- Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

Fasi di sviluppo

- Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

Memoria, compromissione

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
- Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
- Deficienze nutrizionali

Trattamenti

- Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni

Situazionali (personali, ambientali)

- Aspettative che si auto realizzano
- Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- Consumo di alcol
- Mancanza di motivazione
- Inadeguata stimolazione
- Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni)

Mobilità, compromissione /rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- edemi
- apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)
- forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

Situazionali (personali, ambientali)

- fatigue
- obesità
- mancanza di motivazione



- dispnea
- dolore

Fasi di sviluppo

- Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite
- Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

Nausea

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)

Trattamenti

- Effetti della chemioterapia e/o farmaci
- Effetti dell'anestesia

Non adesione (a indicazioni terapeutiche)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)
- Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato

Trattamenti

- Effetti collaterali della terapia
- Ambiente non terapeutico
- Terapia complessa non controllata/prolungata
- Costo economico della terapia
- Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace
- Processo di presa in carico impersonale (multi professionale)

Situazionali (personali, ambientali)

- Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)
- Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- Modificazione dello stato lavorativo
- Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie
- Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale,



paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)

- Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)
- Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)**
- Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)**
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)**
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)**
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)**
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo

Trattamenti

- Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)**
- Diarrea**

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)
- Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)
- Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)

Respirazione, inefficace funzionalità, rischio

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)**
- Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)**

Trattamenti

- Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)**
- Soppressione del riflesso della tosse
- Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)

Situazionali (personali, ambientali)

- Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)
- Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)



Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) <input type="checkbox"/> Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo) <input type="checkbox"/> Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) <input type="checkbox"/> Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) <input type="checkbox"/> Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare <input type="checkbox"/> Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile <input type="checkbox"/> Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti collaterali di farmaci (specificare) <input type="checkbox"/> Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica <input type="checkbox"/> Uso abituale di lassativi <input type="checkbox"/> Mucosite secondaria a radiazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) <input type="checkbox"/> Modello di evacuazione irregolare <input type="checkbox"/> Credenze culturali/sulla salute <input type="checkbox"/> Mancanza di riservatezza <input type="checkbox"/> Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata <input type="checkbox"/> Paura di dolore rettale o cardiaco <input type="checkbox"/> Valutazioni errate <input type="checkbox"/> Incapacità di percepire i segnali intestinali 	
Stress, sovraccarico psicofisico	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare) <input type="checkbox"/> Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra <input type="checkbox"/> Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia) <input type="checkbox"/> Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali <input type="checkbox"/> Perdite funzionali 	
Trauma, rischio	X
Vedere rischio di lesione	



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpento-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	X
RC per crisi falciforme	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X



Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per ipertensione endocranica	X
RC per crisi convulsiva	X
RC per ipertensione intraoculare	X
RC per sindrome neurolettica maligna	X
RC per astinenza da alcol	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	X
RC per lussazione	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione riproduttiva	
RC per sanguinamento genitale pretravaglio	<input type="checkbox"/>
RC per parto pretermine	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione gestazionale	<input type="checkbox"/>
RC per condizioni del feto non rassicuranti	<input type="checkbox"/>
RC per emorragia postpartum	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Nella degenza del nostro pronto soccorso viene impiegato il modello per piccole equipe

ATTIVITA' TECNICHE ASSISTENZIALI SPECIFICHE

- Valutazione della persona in triage in base a un'attribuzione di codice di priorità
- Assistenza alle persone con problematiche potenzialmente evolutive
- Preparazione della persona che si deve sottoporre a intervento chirurgico
- Preparazione della persona che si deve sottoporre a PTCA
- Preparazione della persona che si deve sottoporre a esami diagnostici invasivi e non
- Assistenza post esame diagnostico
- Gestione del politrauma
- Assistenza della persona in stato di coma
- Gestione della NIV
- Gestione dei drenaggi (toracici e addominali)
- Monitorizzazione elettrocardiografica e dei parametri vitali
- Aspirazione vie aeree
- Gestione SNG
- Gestione ossigenoterapia e aerosolterapia
- Gestione accessi venosi centrali e accessi arteriosi
- Gestione vie aeree
- Gestione PIC (pressione intracranica)
- Assistenza alle persone nel soccorso extraospedaliero
- Gestione delle situazioni di periarresto e arresto cardiaco
- Assistenza alla persona con dolore acuto
- Assistenza alle persone con lesioni da ducubito

PROTOCOLLI IN USO NEL SERVIZIO

- Utilizzo dei DPI
- Smaltimento dei rifiuti DPR 254 del 2003
- ALS
- Gestione del politrauma
- Gestione della persona in isolamento
- Gestione della persona sottoposta a trombolisi
- Gestione del rischio biologico
- Emergenza sanitaria extraospedaliera
- Emergenza sanitaria intraospedaliera
- Gestione della persona affetta da SARS
- Gestione della persona con influenza umana A/H1N1