



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome Luca Cognome D'Antoni Telefono 0114393374-0114393372 e-mail lucamariapaolo.dantoni@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto , Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali</p> <p>Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Blocco Operatorio Chirurgico e Specialistico 3° piano OMV Quattro letti operatori, due sale risveglio, due zone separate (pulita e sporca), due postazioni con accesso a internet, una centrale di sterilizzazione.</p> <p>7.30-15.12 14.00-21.42 CPSE-CPSI-OSS Apparecchiature elettromedicali (autoclave-sistema sterilizzazione, laser-elettrobisturi, ecografi, intensificatore di brillantezza, colonne laparoscopiche-microscopi, materassino scaldaletto, video-laringoscopia, fibroscopio, respiratori, defibrillatore, monitor, pompe-siringa,), letto operatorio, presidi antidecubito (materassini in gel)</p> <p>Possibilità di accesso a: mensa, accesso a internet, spogliatoi sul piano, possibilità di accesso a banche dati.</p> <p>Indirizzo via Cibrario 72 Torino Telefono 0114393374-0114393372 Fax 0114393431 e-mail lucamariapaolo.dantoni@unito.it</p> <p>Tram: 9 – 16 - 13 Bus 71 -13 Metro</p>



Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X
Tumore della tiroide Tiroiditi autoimmuni Patologie del surrene Patologie del pancreas (cisti - tumori)	
Malattie Intestinali / digestive	X
Tumore del colon Colecistiti Appendicopatie Diverticolite Infarto intestinale Occlusione intestinale Volvolo Ernia inguinale, ombelicale	
Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X
Fimosi Varicocele Torsione del testicolo Calcolosi renale	
Malattie Oncologiche	X
Tumore della mammella Tumore della prostata Tumore della vescica Tumore del rene Tumore della laringe Tumore della parotide Tumore del testicolo	
Malattie Osteoarticolari	X
Sindrome del tunnel carpale Rizartriosi Sindrome di dupuytren	
Malattie Respiratorie	X
Tonsilliti Sinusiti Deviazioni del setto nasale Tracheotomie	



Malattie Traumatologiche / incidenti	X
Traumatologia della mano (fratture, amputazioni con ricostruzione nervosa/vascolare/tendinea) Traumatologia maxillo- facciale Fratture di orbita e zigomo Fratture del setto nasale Splnectomie Emo e pneumotorace	
Salute in area Materno / infantile	X
Chirurgia pediatrica (ORL- PLASTICA)	
Altro (specificare)	X
Malattie dell'orecchio interno	



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input checked="" type="checkbox"/> Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)	
<input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)	
<input checked="" type="checkbox"/> Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)	
<input checked="" type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)	
Fasi di sviluppo	
<input checked="" type="checkbox"/> Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti	
Adolescente: minaccia del concetto di se correlato all'ingresso in sala operatoria, mancanza di conoscenze	
<input checked="" type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di se per effetti dell'intervento e/o delle potenziali conseguenze post-intervento	
<input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie	

Aspirazione, rischio di	X
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input checked="" type="checkbox"/> Riduzione del livello di coscienza (coma)	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardato svuotamento gastrico (interventi in urgenza, ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)	
<input checked="" type="checkbox"/> Aumento della pressione gastrica (ascite, obesità)	
<input checked="" type="checkbox"/> Fistola tracheo-esofagea	
<input checked="" type="checkbox"/> Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo)	
Trattamenti	
<input checked="" type="checkbox"/> Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)	
<input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)	
Situazionali (personali, ambientali)	



Attività, intolleranza all'attività	X
--	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Inattività (paura di cadere, dolore, secondaria a depressione, mancanza di motivazione, variazione dello stile di vita, insufficiente conoscenza) <input checked="" type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (stress, dolore,)
--

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
---------------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) <input checked="" type="checkbox"/> Deturpazione
--

Cadute, rischio Vedere lesione, rischio	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio <input checked="" type="checkbox"/> trauma orale o facciale, patologie ostruttive del collo <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, deformità del cavo orale, mal occlusione o frattura mascellare, disfagia) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico al viso, collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) <input checked="" type="checkbox"/> Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana (perdite uditive)

Concetto di se, disturbo del	X
-------------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità o perdita di funzioni



Confusione mentale acuta, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, deficit magnesio, ipo/iper glicemia) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit nutrizionali (anemia) <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie) <input checked="" type="checkbox"/> Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) <input checked="" type="checkbox"/> Infezioni (sepsi, meningite, infezione delle vie urinarie nell 'anziano) <input checked="" type="checkbox"/> Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Anestesia generale, sedativi/ipnotici, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, atropina, ipoglicemizzanti) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dolore, immobilità 	
Deglutizione, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione della coscienza per anestesia <input checked="" type="checkbox"/> Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Alterazione del livello di coscienza 	
Dolore acuto / cronico (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici (fratture) <input checked="" type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. <input checked="" type="checkbox"/> Dolori addominali <input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, puntura/biopsia) <input checked="" type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato <input checked="" type="checkbox"/> Iperattività <input checked="" type="checkbox"/> Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti) <input checked="" type="checkbox"/> Risposta allergica 	



Eliminazione urinaria compromessa	X
Per Incontinenza urinaria (specificare): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input checked="" type="checkbox"/> Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input checked="" type="checkbox"/> Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Anomalie delle vie urinarie <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (fimosi, trauma) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva) 	

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> variazione dell'aspetto (per intervento chirurgico) 	

Incontinenza urinaria funzionale	X
Fattori correlati Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione del tono vescicale per uso di adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti 	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
Fattori correlati Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva <input checked="" type="checkbox"/> Strumentazione diagnostica <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) 	



Infezione, rischio di		X
Fattori correlati		
Trattamenti		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale	
	<input checked="" type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, terapia farmacologica (specificare)	
Situazionali (personali, ambientali)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità	
	<input checked="" type="checkbox"/> Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)	
Fasi di sviluppo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)	
Insonnia		X
Fattori correlati		
Fisiopatologici		
Situazionali (personali, ambientali)		
<input type="checkbox"/>	Inadeguata attività fisica durante il giorno	
	<input checked="" type="checkbox"/> Dolore cronico	
	<input checked="" type="checkbox"/> Risposte ansiose	
<input type="checkbox"/>	Modifiche ambientali (ricovero per intervento chirurgico)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Paura	
Ipotermia		X
Fattori correlati		
Situazionali (personali, ambientali)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione a freddo intraoperatorio	
	<input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)	
Fasi di sviluppo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. bambino, anziano)	
Lesione, rischio di		X
Fattori correlati		
Trattamenti		
	<input checked="" type="checkbox"/> Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorellassanti...specificare)	
Situazionali (personali, ambientali)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ambiente non familiare (es. Ospedale)	



Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio		X
Fattori correlati		
Fisiopatologici	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione) <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi) <input checked="" type="checkbox"/> Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento <input checked="" type="checkbox"/> Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite) 	
Trattamenti	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia <input checked="" type="checkbox"/> Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore <input checked="" type="checkbox"/> Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento 	
Situazionali (personali, ambientali)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano) 	
Fasi di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata) 	

Liquidi, eccessivo volume di		X
Fattori correlati		
Fisiopatologici	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche) <input checked="" type="checkbox"/> Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite) <input checked="" type="checkbox"/> Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) 	
Trattamenti	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea) 	
Situazionali (personali, ambientali)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione) <input checked="" type="checkbox"/> Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità) 	
Fasi di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare 	

Liquidi, insufficiente volume di		X
Fattori correlati		
Fisiopatologici	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato) <input checked="" type="checkbox"/> Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite) 	



Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, condizioni cardiache) <input checked="" type="checkbox"/> Rigidità delle articolazioni o contratture <input checked="" type="checkbox"/> dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	
Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti dell'anestesia 	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, anestesia) <input checked="" type="checkbox"/> Soppressione del riflesso della tosse <input checked="" type="checkbox"/> Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità (per intervento chirurgico/ dolore, paura, ansia) 	
Stipsi, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dolore alla defecazione (per emorroidi) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti sulla peristalsi dell'anestesia e della manipolazione chirurgica 	
Stress, sovraccarico psicofisico	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di far fronte a condizioni invalidanti, perdite funzionali 	
Trasloco, stress da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Trasferimento in sala operatoria <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento 	



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema/ embolia polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
RC per pneumotorace	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per astinenza da alcol	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

PERCORSO IN CENTRALE STERILIZZAZIONE:

Obiettivi

- Acquisizione di conoscenze relative alla sicurezza ed alla prevenzione e controllo delle infezioni
- Acquisizione di conoscenze del processo di sterilizzazione in autoclavi a vapore.

Modalità operative

- Presentazione dei locali e della loro destinazione d'uso con particolare attenzione al concetto di percorso sporco-pulito.
- Conoscenza delle principali normative / tecniche riguardanti il processo di sterilizzazione
- Acquisizione di conoscenze sullo strumentario base per le procedure chirurgiche.
- Acquisizione di conoscenze per l'utilizzo degli strumenti per la rintracciabilità

Durata percorso: Tirocinio 4 settimane: 2-3 giorni; Tirocinio 5-8 settimane: 3-4 giorni

PERCORSO IN SALA OPERATORIA:

- Conoscere ed utilizzare le principali procedure organizzative della struttura.
- Conoscere l'utilizzo dei principali strumenti operativi, le attrezzature, le tecnologie in uso nella sala operatoria.
- Sviluppare competenze infermieristiche per l'assistenza in sala operatoria per alcuni problemi assistenziali tra quelli descritti, riferiti alla gestione pre-intra e post operatoria.