



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome Carmen Cognome Atzori Telefono 3477975368 e-mail carmela.atzori@unito.it carmen.atzori63@gmail.com
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N° locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	D.S.M. S.C. Ospedaliera e dell'Urgenza - S.P.D.C. p.o. Amedeo di Savoia 14 posti letto Turni: 7/14.42 14.32/22.35 22.25/7.10 Coordinatore Infermieristico, infermieri, OSS, ausiliari, psicologi, medici psichiatri Internet dai PC del reparto
Contatti e riferimenti	Indirizzo Corso Svizzera 164 Telefono 0114393874-0114393875 Fax 0114393876 e-mail
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	GTT 3-9



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Salute Mentale	X

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) <input type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative <input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) <input type="checkbox"/> Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...) <input type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei <input type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio <input type="checkbox"/> Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento 	

Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
<p>Personali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pregressi episodi di autolesionismo <input type="checkbox"/> Abusi fisici, psichici, o sessuali <input type="checkbox"/> Inefficaci capacità di coping <input type="checkbox"/> Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti 	



Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto <input type="checkbox"/> Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa) <input type="checkbox"/> Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna) <input type="checkbox"/> Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità <input type="checkbox"/> Insuccesso scolastico <input type="checkbox"/> Relazione inefficace con i propri genitori <input type="checkbox"/> Relazioni abusive <input type="checkbox"/> Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli <input type="checkbox"/> Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione <input type="checkbox"/> Storia di numerosi insuccessi <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative <input type="checkbox"/> Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento <input type="checkbox"/> Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento 	

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver <input type="checkbox"/> Modello di coping inefficace <input type="checkbox"/> Salute fisica compromessa <input type="checkbox"/> Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari <input type="checkbox"/> Durata dell'assistenza richiesta <input type="checkbox"/> Isolamento <input type="checkbox"/> Pause di riposo/svago insufficienti o <input type="checkbox"/> Risorse economiche insufficienti <input type="checkbox"/> Assenza o non disponibilità di sostegno <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare) 	



Casa, compromessa gestione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. <input type="checkbox"/> Mancata disponibilità di un sistema di sostegno <input type="checkbox"/> Perdita di un familiare <input type="checkbox"/> Deficit di conoscenze <input type="checkbox"/> Insufficienza di risorse economiche 	
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia <p>Trattamenti</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) <input type="checkbox"/> Barriere psicologiche (paura, timidezza) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione cognitiva 	
Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa <input type="checkbox"/> Immobilità o perdita di funzioni <input type="checkbox"/> Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali <input type="checkbox"/> Preferenze sessuali <input type="checkbox"/> Gravidanza nel corso dell'adolescenza <input type="checkbox"/> Differenza di sesso nell'educazione dei figli <input type="checkbox"/> Esperienze di violenza da parte dei genitori <input type="checkbox"/> Cambiamento del consueto modello di responsabilità <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità) <input type="checkbox"/> Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità) 	



Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Depressione, situazioni non familiari 	
Coping inadeguato della famiglia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori <input type="checkbox"/> Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli 	
Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) <input type="checkbox"/> Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione <input type="checkbox"/> Criticità delle relazioni con genitori/caregiver <input type="checkbox"/> Disorganizzazione del sistema familiare <input type="checkbox"/> Inefficace capacità di problem solving <input type="checkbox"/> Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress <input type="checkbox"/> Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale) <input type="checkbox"/> Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento) <input type="checkbox"/> Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva) <input type="checkbox"/> Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative. <input type="checkbox"/> Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani. <input type="checkbox"/> Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche 	



Cura di sé, deficit (alimentazione) Incapacità di (specificare): <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni<input type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo<input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Deficit cognitivi<input type="checkbox"/> Scarsa motivazione<input type="checkbox"/> Affaticamento<input type="checkbox"/> Confusione mentale<input type="checkbox"/> Ansia che paralizza	
Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti<input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Confusione mentale<input type="checkbox"/> Ansia che paralizza	
Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti<input type="checkbox"/> curare il proprio aspetto<input type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario<input type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua<input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo<input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione<input type="checkbox"/> Confusione mentale<input type="checkbox"/> Ansia che paralizza	



Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)	X
Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto 	
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza 	

Cura di sé, deficit (strumentale)	X
Difficoltà a (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> usare il telefono <input type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> lavare e stirare <input type="checkbox"/> preparare i pasti <input type="checkbox"/> fare la spesa <input type="checkbox"/> gestire il denaro <input type="checkbox"/> assumere i farmaci 	
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza 	

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare) 	

Immobilizzazione, sindrome da	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Depressione 	



Insomnia	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)<input type="checkbox"/> Eccessivo dormire di giorno<input type="checkbox"/> Depressione<input type="checkbox"/> Risposte ansiose<input type="checkbox"/> Paura	
Memoria, compromissione	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Aspettative che si auto realizzano<input type="checkbox"/> Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)<input type="checkbox"/> Consumo di alcol<input type="checkbox"/> Mancanza di motivazione<input type="checkbox"/> Inadeguata stimolazione<input type="checkbox"/> Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni)	
Mobilità, compromissione /rischio di	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mancanza di motivazione	
Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)<input type="checkbox"/> Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato Trattamenti <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Effetti collaterali della terapia<input type="checkbox"/> Ambiente non terapeutico<input type="checkbox"/> Terapia complessa non controllata/prolungata<input type="checkbox"/> Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace<input type="checkbox"/> Processo di presa in carico impersonale (multi professionale) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di	



assistenza per i figli, tempo inclemente)

- Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- Modificazione dello stato lavorativo
- Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)

Stress, sovraccarico psicofisico

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

Situazionali (personali, ambientali)

- Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)
- Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra
- Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)
- Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali
- Perdite funzionali

Trasloco, stress da

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima)

Situazionali (personali, ambientali)

- Risorse economiche insufficienti
- Elevati livelli di cambiamenti (per ammissione in strutture residenziali/di assistenza)
- Perdita di legami sociali/familiari
- Abbandono
- Modifica delle relazioni familiari
- Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

In questo reparto lo studente avrà modo di sperimentare una relazione d'aiuto in uno stadio di acuzie delle patologie prevalentemente trattate in stretta collaborazione con tutta l'equipe del reparto.

Avrà anche modo di seguire uno o più assistiti nel percorso di cura accompagnandolo nel percorso di aiuto personalizzato che talora prevede l'inserimento in un DH territoriale.