



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome CARMEN Cognome ROLLO Telefono 011/2402216 011/2402944 e-mail carmen.rollo@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>H. S.GIOVANNI BOSCO Reparto UROLOGIA 2° PIANO</p> <p>Coordinatore Infermieristico PELLIZZARI DANIELA</p> <p>Equipe di lavoro 8 Urologi 12 Infermieri (di cui 3 infermieri part-time) 2 Infermieri generici, 5 OSS (di cui 1 interinale), 1 segretaria di reparto</p> <p>Posti letto 18 al 2° piano + 4 c/o reparto di ortopedia al 7° p.</p> <p>Orari di servizio Mattino:7 -14.30 Pomeriggio:14.30-22.30 Notte: 22.30-7</p> <p>Indirizzo P.zza Donatore di Sangue, 3 Telefono 011/2402216 011/2402944 Fax 011/2402456 e-mail</p>



Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Nefrologiche, genito/urinarie

X

Idronefrosi, calcolosi renale e vescicale, adenoma prostatico

Malattie Oncologiche

X

Neoplasia vescicale, neoplasia prostatica, neoplasia renale, neoplasia ureterale, neopl.testicolare.



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Alimentazione del bambino, inefficace modello di (dalla nascita ai 9 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Aumento del fabbisogno calorico secondario a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Instabilità della temperatura corporea <input type="checkbox"/> Tachipnea con aumento dello sforzo respiratorio <input type="checkbox"/> Infezione <input type="checkbox"/> Labioschisi e/o palatoschisi <input type="checkbox"/> Sviluppo fisico <input type="checkbox"/> Cicatrizzazione di ferite <input type="checkbox"/> Scompenso o malattia degli organi vitali <p>Debolezza/ipotonia muscolare secondaria a</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Malnutrizione <input type="checkbox"/> Prematurità <input type="checkbox"/> Malattia acuta/cronica <input type="checkbox"/> Letargia <input type="checkbox"/> Difetti congeniti <input type="checkbox"/> Scompenso o malattia di organi vitali <input type="checkbox"/> Ritardo/compromissione neurologica <input type="checkbox"/> Iperbilirubinemia <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stato ipermetabolico (intervento chirurgico, procedure dolorose) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare (farmaci, deprivazione del sonno) <input type="checkbox"/> Ipersensibilità orale <input type="checkbox"/> Precedente digiuno prolungato <p>Situazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incongruenze fra i caregiver (che provvedono all'alimentazione) <input type="checkbox"/> Mancanza di conoscenze o di impegno da parte dei caregiver in rapporto a regime dietetico o a bisogni alimentari <input type="checkbox"/> Presenza di stimoli orali o facciali nocivi e/o assenza di stimoli orali <input checked="" type="checkbox"/> X Inadeguata produzione di latte materno 	

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) <input type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative 	



- Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)
- Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)
 - Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto
- Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei
- Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio
- Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento

Concetto di se, disturbo del

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

Situazionali (personali, ambientali)

- Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa
- Immobilità o perdita di funzioni
- Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali
- Preferenze sessuali
- Gravidanza nel corso dell'adolescenza
- Differenza di sesso nell'educazione dei figli
- Esperienze di violenza da parte dei genitori
- Cambiamento del consueto modello di responsabilità

Fasi di sviluppo

- Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)
- Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali



<input type="checkbox"/> Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansioni invasive) <input type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Febbre <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato <input type="checkbox"/> Iperattività <input checked="" type="checkbox"/> Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti) <input type="checkbox"/> Risposta allergica <input type="checkbox"/> Irritanti chimici <input type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto <input type="checkbox"/> Ansia grave e repressa Fasi di sviluppo Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a <input type="checkbox"/> 1 anno: coliche <input type="checkbox"/> Prima infanzia: dentizione, otalgia <input type="checkbox"/> Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita <input type="checkbox"/> Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.
--

Eliminazione urinaria compromessa Per Incontinenza urinaria (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <input checked="" type="checkbox"/> Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input checked="" type="checkbox"/> Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input type="checkbox"/> Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input type="checkbox"/> Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)	

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico) Situazionali (personali, ambientali) <input type="checkbox"/> Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare) <input type="checkbox"/> Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)	



Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione del sensorio <input type="checkbox"/> Stato di incoscienza <input type="checkbox"/> Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale) <input type="checkbox"/> Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche) <input type="checkbox"/> Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia) <input checked="" type="checkbox"/> Cancro <p>Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Intervento chirurgico <input type="checkbox"/> Ventilazione meccanica <input type="checkbox"/> Linee venose <input type="checkbox"/> Trazione/gesso/tutore ortopedico <input type="checkbox"/> Immobilità prescritta <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Depressione <input type="checkbox"/> Fatigue <input type="checkbox"/> Stato di debilitazione <input type="checkbox"/> Dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida <input type="checkbox"/> Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile 	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria <input type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva <input type="checkbox"/> Strumentazione diagnostica <input type="checkbox"/> Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della mobilità <input type="checkbox"/> Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <input type="checkbox"/> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	



Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) <input type="checkbox"/> Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica <p>Trattamenti</p> <p>X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità <input type="checkbox"/> Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio) <input type="checkbox"/> gessato, pieghe cutanee) <input type="checkbox"/> Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo <input type="checkbox"/> Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali <input type="checkbox"/> Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	

Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) <input type="checkbox"/> Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo) <input type="checkbox"/> Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) <input type="checkbox"/> Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) <input type="checkbox"/> Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare <input type="checkbox"/> Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile <input type="checkbox"/> Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti collaterali di farmaci (specificare) X Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica <input type="checkbox"/> Uso abituale di lassativi <input type="checkbox"/> Mucosite secondaria a radiazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) <input type="checkbox"/> Modello di evacuazione irregolare <input type="checkbox"/> Credenze culturali/sulla salute <input type="checkbox"/> Mancanza di riservatezza 	



- Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata
- Paura di dolore rettale o cardiaco
- Valutazioni errate
- Incapacità di percepire i segnali intestinali



Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate
Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse
nell'elenco
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A.
Edizioni, 2010)

Sindrome da immobilizzazione

Fattori correlati: - Cancro

Correlati ad intervento: - Int.to chirurgico
- Immobilità prescritta

Compromissione dell'integrità cutanea



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	<input type="checkbox"/>
RC per aritmie	<input type="checkbox"/>
RC per edema polmonare	<input type="checkbox"/>
RC per trombosi venosa profonda	<input type="checkbox"/>
RC per ipovolemia	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome compartimentale	<input type="checkbox"/>
RC per embolia polmonare	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	<input type="checkbox"/>
RC per atelectasia/polmonite	<input type="checkbox"/>
RC per costrizione tracheobronchiale	<input type="checkbox"/>
RC per pneumotorace	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	<input type="checkbox"/>
RC per bilancio azotato negativo	<input type="checkbox"/>
RC per squilibri elettrolitici	<input type="checkbox"/>
RC per sepsi	<input type="checkbox"/>
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	<input type="checkbox"/>
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	<input type="checkbox"/>
RC per reazione allergica	<input type="checkbox"/>
Rc per trombocitopenia	<input type="checkbox"/>
RC per infezioni opportunistiche	<input type="checkbox"/>
RC per crisi falciforme	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	<input type="checkbox"/>
RC per calcoli renali	X



Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per ipertensione endocranica	<input type="checkbox"/>
RC per crisi convulsiva	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione intraoculare	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome neurolettica maligna	<input type="checkbox"/>
RC per astinenza da alcol	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	<input type="checkbox"/>
RC per sanguinamento gastrointestinale	<input type="checkbox"/>
RC per disfunzione epatica	<input type="checkbox"/>
RC per iperbilirubinemia	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	<input type="checkbox"/>
RC per lussazione	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione riproduttiva	
RC per sanguinamento genitale pretravaglio	<input type="checkbox"/>
RC per parto pretermine	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione gestazionale	<input type="checkbox"/>
RC per condizioni del feto non rassicuranti	<input type="checkbox"/>
RC per emorragia postpartum	<input type="checkbox"/>
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<input checked="" type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	<input type="checkbox"/>



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Assistenza e presa in carico del paziente dal ricovero alla fase pre e post-operatoria e alla dimissione per interventi programmati, d'urgenza e di elezione.
- Gestione della persona assistita nel post-operatorio sia per interventi endoscopici (con ausilio della cistoclisi), sia per interventi chirurgici a cielo aperto ad alta complessità assistenziale.
- Saper gestire e riconoscere i sanguinamenti con conseguenti tamponamenti vescicali.
- Acquisizione di interventi educativi: dalla gestione delle varie derivazioni urinarie (catetere pielostomico, urostomia addominale definitiva, neo-vescica ortotopica), al corretto mantenimento del catetere vescicale con il coinvolgimento dei familiari più vicini al paziente.
- Consegna verbale ed informatica ad ogni cambio turno per il passaggio delle informazioni su ciascun paziente.
- Utilizzo di protocolli e linee guida presenti in reparto.
- Utilizzo dei principali CV e modalità d'uso e di assistenza.
- Opportunità di apprendimento c/o ambulatorio di urologia (cambi catetere vesc., instillazioni vescicali, biopsie prostatiche,..).
- Possibilità di accedere in C.O. correlato al percorso diagnostico-terapeutico del paziente affidato allo studente.