




## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>SARA</b> Cognome <b>FADDA</b> Telefono <b>0114393851 (REPARTO)</b> e-mail <b>sara.fadda@unito.it</b></p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p><b>Contatti e riferimenti</b></p> <p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p style="text-align: center;"><b>OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA MALATTIE INFETTIVE I PADIGLIONE DE MATTIA N PIANO TERRA</b></p> <p>Numero locali: <b>4</b> numero posti letto: <b>23 (15 + 8)</b> orario apertura al pubblico: <b>13 – 14.30 e 19 – 20.30</b> orario lavoro infermieri: <b>mattino 7 – 14.42</b> <b>Pomeriggio: 14.32 – 22.35</b> <b>Notte: 14.25 – 7.10</b></p> <p>Orario di lavoro studenti infermieri: <b>mattino 7 – 15</b> <b>Pomeriggio: 14 – 22</b></p> <p>Figure professionali: <b>medici, infermieri, oss e studenti infermieri</b></p> <p>Risorse strumentali: <b>sollevamalati, macchina lettura EGA, Ventilatori per NIV e CPAP, aspiratori endotracheali, ecografo, aspiratori per drenaggi toracici</b></p> <p>Servizi allo studenti: <b>mensa e accesso internet in reparto</b></p> <p>Indirizzo <b>corso Svizzera 164</b> Telefono <b>0114393851</b> Fax <b>0114393947</b> e-mail <b>sara.fadda@unito.it</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Map data ©2014 Google</p> </div> <p><b>9 – 3 fermata ospedale amedeo di savoia</b></p>



## Allegato 1

### Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

#### Dipendenze patologiche

X

Abuso di sostanze (alcol, droghe, farmaci)

#### Malattie Cardiovascolari

X

- Endocarditi
- Pericarditi

#### Malattie Cerebrovascolari

X

- Meningiti
- Encefaliti virali
- Demenza da AIDS
- Accessi cerebrali

#### Malattie Intestinali / digestive

X

- Diarree infettive (Clostridium, salmonellosi, ecc...)

#### Malattie Infettive (Malattie trasmissibili)

X

- Infezione da HIV e AIDS
- Epatiti da HAV, HBV, HCV
- MALARIE
- IST (Infezioni sessualmente trasmesse)
- Morbillo
- Varicella (Herpes zoster)
- Patogeni alert (klebsielle, MRSA, ecc)
- Tuberculosis polmonare

#### Malattie Nefrologiche, genito/urinarie

X

- Infezioni delle vie urinarie (IVU)
- Pielonefriti



<b>Malattie Neuromuscolari</b>	X
<ul style="list-style-type: none"><li>• Neuropatie</li><li>• Sindrome di Guillain-Barré</li></ul>	
<b>Malattie Oncologiche</b>	X
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sarcoma di kaposi</li><li>• Linfomi</li><li>• Malattia di Castellman</li></ul>	
<b>Malattie Osteoarticolari</b>	X
<ul style="list-style-type: none"><li>• Spondilodisciti</li><li>• Osteomieliti</li><li>• Infezioni di protesi articolari</li></ul>	
<b>Malattie Rare</b>	X
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sindrome di Moschowitz</li><li>• Granulomatosi di Wegener</li></ul>	
<b>Malattie Respiratorie</b>	X
<ul style="list-style-type: none"><li>• Polmoniti</li><li>• BPCO</li><li>• Ascessi polmonari</li></ul>	
<b>Altro (specificare)</b>	X
<ul style="list-style-type: none"><li>• Infezioni cutanee e dei tessuti molli</li><li>• Infezioni ferite chirurgiche</li><li>• Sepsi</li><li>• TBC disseminata (ossea, miliare, renale, ecc..)</li></ul>	



## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
<input type="checkbox"/> Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)	
<input type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative	
<input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)	
<input type="checkbox"/> Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)	
<input type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
<input type="checkbox"/> Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto	
<input type="checkbox"/> Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei	
<input type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio	
<input type="checkbox"/> Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

Aspirazione, rischio di	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
<input type="checkbox"/> Riduzione del livello di coscienza ( per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)	
<input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi della tosse/faringeo	
<input type="checkbox"/> Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)	
<input type="checkbox"/> Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)	
<input type="checkbox"/> Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)	
<input type="checkbox"/> Fistola tracheo-esofagea	
<input type="checkbox"/> Compromissione dei riflessi protettivi ( chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)	
<b>Trattamenti</b>	
<input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)	
<input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	



- Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo
- Assunzione di alimenti in corso di intossicazione

**Fasi di sviluppo**

- Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione
- Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore
- Persona anziana: dentizione inadeguata

**Attività, intolleranza all'attività**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per

- Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)
- Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare)
- Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)

Aumento del fabbisogno metabolico per

- Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)
- Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)
- Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)

**Trattamenti**

- Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)
- Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)
- Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)
- Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)

**Fasi di sviluppo**

- Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali

**Concetto di se, disturbo del**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa
- Immobilità o perdita di funzioni
- Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali
- Preferenze sessuali
- Gravidanza nel corso dell'adolescenza
- Differenza di sesso nell'educazione dei figli
- Esperienze di violenza da parte dei genitori



- Cambiamento del consueto modello di responsabilità

**Fasi di sviluppo**

- Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)
- Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)

**Confusione mentale acuta**



Fattori correlati

**Fattori di rischio**

Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per

- Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)
- Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)
- Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)
- Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)
- Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)
- Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)
- Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)

**Trattamenti**

- Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenintoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.
- Dolore, fecaloma, immobilità,
- Depressione, situazioni non familiari
- Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)

**Coping inefficace**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

**Trattamenti**

- Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- Criticità delle relazioni con genitori/caregiver



- Disorganizzazione del sistema familiare
- Inefficace capacità di problem solving
- Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress
- Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)
- Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)
- Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale ( ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

#### Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

#### Cura di sé, deficit (alimentazione)

X

##### Incapacità di (specificare):

- tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- portare il cibo alla bocca

##### Fattori correlati

##### Fisiopatologici

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare) dolore, astenia**
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare) inutilizzo prolungato**
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso**
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

##### Trattamenti

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)**
- Affaticamento e dolore post operatori**

##### Situazionali (personali, ambientali)

- Deficit cognitivi**
- Dolore**



<input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
---

<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> <b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b> <input type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	<b>X</b>
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) problematiche neurologiche <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) dolore - astenia <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) inutilizzo prolungato <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressioni a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p><b>Trattamenti</b></p> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
---





<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> <b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>curare il proprio aspetto</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>acquistare o cambiare capi di vestiario</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>o il flusso dell'acqua</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>percepire il bisogno di cure igieniche</b></li> </ul>	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Mancanza di coordinazione motoria per</b> (specificare) <b>problematiche neurologiche</b></li> <li><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Atrofia per</b> (specificare) <b>inutilizzo prolungato</b></li> <li><input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Stato comatoso</b></li> <li><input type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> <li><input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti</li> <li><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li> <li><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li> <li><input type="checkbox"/> Deficit somatici</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Uso di dispositivi esterni</b> (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li><input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Deficit cognitivi</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Dolore</b></li> <li><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Affaticamento</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Confusione mentale</b></li> <li><input type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	

<b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b> <b>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>servirsi del gabinetto/comoda</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>trasferirsi sul gabinetto/comoda</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>eseguire pratiche igieniche adeguate</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>pulire il gabinetto o la comoda</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</b></li> </ul>	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Mancanza di coordinazione motoria per</b> (specificare) <b>problematiche neurologiche</b></li> <li><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li> </ul>	



- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare) dolore
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatici

**Trattamenti**

- Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Deficit cognitivi
- Dolore
- Scarsa motivazione
- Affaticamento
- Confusione mentale
- Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

**Cura di sé, deficit (strumentale)**

**Difficoltà a (specificare)**

- usare il telefono
- accedere ai mezzi di trasporto
- lavare e stirare
- preparare i pasti
- fare la spesa
- gestire il denaro
- assumere i farmaci

X

**Fattori correlati**

**Fisiopatologici**

- Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) problematiche neurologiche
- Spasticità o flaccidità per (specificare)
- Debolezza muscolare per (specificare) dolore
- Paralisi per (specificare)
- Atrofia per (specificare)
- Contratture muscolari per (specificare)
- Stato comatoso
- Disturbi visivi
- Arti non funzionanti o mancanti
- Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- Comportamenti ritualistici
- Deficit somatiformi

**Trattamenti**



- Uso di dispositivi esterni** (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)

- Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Deficit cognitivi**

- Dolore**

- Scarsa motivazione

- Affaticamento

- Confusione mentale**

- Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare**

**Deglutizione, compromissione**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barré, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)**
- Tumore / edema tracheo-esofageo**
- Irritazione della cavità orofaringea**
- Diminuzione della salivazione

**Trattamenti**

- Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso
- Riduzione della coscienza per anestesia
- Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica
- Esofagite da radioterapia

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Alterazione del livello di coscienza**
- Fatigue**

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione**
- Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto**

**Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)**
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)**
- Inflammatione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.**
- Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)**
- Effetti di un tumore su (specificare)



- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

**Trattamenti**

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Febbre
- Immobilità/posizionamento inappropriato
- Iperattività
- Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

**Fasi di sviluppo**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- 1 anno: coliche
- Prima infanzia: dentizione, otalgia
- Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
- Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.

**Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

**Trattamenti**

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Febbre
- Immobilità/posizionamento inappropriato
- Iperattività
- Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)



- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

### Eliminazione urinaria compromessa

Per Incontinenza urinaria (specificare):

- Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)
- Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)
- Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)
- Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)
- Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)
- Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)
- Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

#### Trattamenti

- Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)

### Fatigue

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)
- Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)
- Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)
- Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla., SLA, M. Parkinson, AIDS)
- Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore
- Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)
- Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)

#### Trattamenti

- Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,
- Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)

#### Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)
- Eccessive richieste di ruolo



- Richieste emozionali soverchianti
- Stress emotivo
- Disturbi del sonno

### Immagine corporea, Disturbo/Rischio di

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento

#### Trattamenti

- variazione dell'aspetto ( per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)

#### Situazionali (personali, ambientali)

- Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)
- Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza
- 

### Immobilizzazione, sindrome da

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- Riduzione del sensorio
- Stato di incoscienza
- Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)
- Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)
- Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)
- Cancro

Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)

#### Trattamenti

- Intervento chirurgico
- Ventilazione meccanica
- Linee venose
- Trazione/gesso/tutore ortopedico

- Immobilità prescritta

#### Situazionali (personali, ambientali)

- Depressione
- Fatigue
- Stato di debilitazione
- Dolore

#### Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida
- Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile

### Incontinenza fecale

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici



<input type="checkbox"/> Compromissione dello sfintere rettale ( per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica) <input type="checkbox"/> Compromissione delle funzioni cognitive <input type="checkbox"/> Iperdistensione rettale per stipsi cronica <input type="checkbox"/> Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) <input type="checkbox"/> Trattamenti <input type="checkbox"/> Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni. <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input type="checkbox"/> Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)
---

<b>Incontinenza urinaria da sforzo</b>	<b>X</b>
--	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input type="checkbox"/> Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale <input type="checkbox"/> Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> Persona anziana: perdita di tono muscolare
---

<b>Incontinenza urinaria da urgenza</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo <b>Trattamenti</b> <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale, <input type="checkbox"/> Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input type="checkbox"/> Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti <b>Fasi di sviluppo</b> <input type="checkbox"/> Bambino: limitata capacità vescicale <input type="checkbox"/> Persona anziana: diminuita capacità vescicale
--

<b>Incontinenza urinaria funzionale</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input type="checkbox"/> Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva <b>Trattamenti</b>
--



- Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione della mobilità
- Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

**Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria
- Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

**Trattamenti**

- Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- Strumentazione diagnostica
- Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Compromissione della mobilità
- Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive





Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</li> <li><input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica, hiv e aids</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</li> <li><input type="checkbox"/> Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee)</li> <li><input type="checkbox"/> Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo</li> <li><input type="checkbox"/> Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali</li> <li><input type="checkbox"/> Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</li> </ul>	

Ipertermia	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)</li> </ul> <p><b>Situazionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Esposizione al calore, al sole</li> <li><input type="checkbox"/> Abbigliamento inadeguato al clima</li> <li><input type="checkbox"/> Assenza di condizionamento dell'aria</li> <li><input type="checkbox"/> Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero</li> <li><input type="checkbox"/> Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)</li> <li><input type="checkbox"/> Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età</li> </ul>	

Lesione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)</li> </ul>	



- Alterazioni della mobilità** (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- Fatigue**
- Ipotensione ortostatica
- Insufficienza vertebro basilare
- Disturbi vestibolari
- Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)
- Movimenti tonico-clonici (convulsioni)**

**Trattamenti**

- Lungo allettamento**
- Effetti sulla mobilità/sensorio** (sedativi, miorilassanti...specificare)
- Gesso, stampelle, deambulatore, bastone

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione o perdita memoria a breve termine**
- Alterata capacità di giudizio** ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio)
- Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura)
- Pericolo di incendio
- Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- Scarpe inadatte,
- Disattenzione del caregiver
- Uso improprio degli ausili
- Storia di incidenti
- Andatura instabile

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli
- Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

**Liquidi, eccessivo volume di**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Compromissione dei meccanismi regolatori** (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio** (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- Anomalie venose e arteriose** (vene varicose, vasculopatia periferica,. Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

**Trattamenti**

- Ritenzione di sodio e acqua** (terapia corticosteroidea)
- Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Eccessivo apporto di sodio/liquidi**
- Inadeguato apporto proteico** (dieta squilibrata, malnutrizione)
- Ristagno venoso declive/venostasi ( per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)



- Compromissione venosa da utero gravido

**Fasi di sviluppo**

- Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

**Liquidi, insufficiente volume di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Vomito/nausea
- Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- Dieta scorretta/digiuno
- Nutrizione per sonda con soluzione concentrata
- Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
- Esposizione a climi estremi
- Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
- Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

**Fasi di sviluppo**

- Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

**Mobilità, compromissione /rischio di**



Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- edemi
- apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)
- forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- fatigue
- obesità
- mancanza di motivazione
- dispnea
- dolore

**Fasi di sviluppo**



- Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite
- Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

## Nausea

X

Fattori correlati

### Fisiopatologici

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)

### Trattamenti

- Effetti della chemioterapia e/o farmaci
- Effetti dell'anestesia

## Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di

X

Fattori correlati

### Fisiopatologici

- Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)
- Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)
- Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo

### Trattamenti

- Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

### Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- Diarrea

### Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate



conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)

- Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)
- Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)

## Respirazione, inefficace funzionalità, rischio

X

Fattori correlati

### Fisiopatologici

- Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)
- Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)

### Trattamenti

- Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)
- Soppressione del riflesso della tosse
- Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)

### Situazionali (personali, ambientali)

- Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)
- Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)

## Stipsi

X

Fattori correlati

### Fisiopatologici

- Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)
- Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)
- Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)
- Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)
- Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare
- Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile
- Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)

### Trattamenti

- Effetti collaterali di farmaci (specificare)
- Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica
- Uso abituale di lassativi
- Mucosite secondaria a radiazioni

### Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)
- Modello di evacuazione irregolare
- Credenze culturali/sulla salute
- Mancanza di riservatezza



- Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata**
- Paura di dolore rettale o cardiaco
- Valutazioni errate
- Incapacità di percepire i segnali intestinali



### Allegato 3

#### **PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI**

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	<input type="checkbox"/>
RC per ipovolemia	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome compartimentale	<input type="checkbox"/>
RC per embolia polmonare	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	<input type="checkbox"/>
RC per costrizione tracheobronchiale	<input type="checkbox"/>
RC per pneumotorace	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	<input type="checkbox"/>
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	X
RC per crisi falciforme	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	<input type="checkbox"/>
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	<input type="checkbox"/>



<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per ipertensione endocranica	X
RC per crisi convulsiva	X
RC per ipertensione intraoculare	<input type="checkbox"/>
RC per sindrome neurolettica maligna	<input type="checkbox"/>
RC per astinenza da alcol	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per ileo paralitico	<input type="checkbox"/>
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica</b>	
RC per fratture patologiche	<input type="checkbox"/>
RC per lussazione	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione riproduttiva</b>	
RC per sanguinamento genitale pretravaglio	<input type="checkbox"/>
RC per parto pretermine	<input type="checkbox"/>
RC per ipertensione gestazionale	<input type="checkbox"/>
RC per condizioni del feto non rassicuranti	<input type="checkbox"/>
RC per emorragia postpartum	<input type="checkbox"/>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	<input type="checkbox"/>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X





## **Allegato 4**

### **APPRENDIMENTO OFFERTO**

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

#### Interventi assistenziali infermieristici:

- **UTILIZZO DELLE MISURE DI ISOLAMENTO (TIPO A e C)**
- **PREPARAZIONE E ASSISTENZA DELLA PERSONA PRIMA, DURANTE E DOPO L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI, INVASIVI E NON (ES. RACHICENTESI, PARACENTESI, INFUSIONE DI FARMACI CHEMIOTERAPICI, BIOPSIA OSSEA, BRONCOSCOPIA, BIOPSIA CUTANEA, ECC)**
- **ASSISTENZA ALLA PERSONA ASSISTITA SOTTOPOSTA A VENTILAZIONE ASSISTITA CON NIV/CPAP**
- **COLLABORAZIONE CON IL MEDICO ANESTESISTA PER IL POSIZIONAMENTO DI CVC A BREVE TERMINE AL LETTO ED APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA AZIENDALE PER LA GESTIONE DI TUTTI I TIPI DI CATETERI VENOSI CENTRALI**
- **DISCUSSIONE CASI CLINICI CON L'EQUIPE MULTIPROFESSIONALE**
- **EDUCAZIONE TERAPEUTICA ALLE PERSONE CON NUOVA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA HIV E/O HCV, RIGUARDANTE LA TERAPIA ANTIRETROVIRALE (HAART) E LE MISURE PRECAUZIONALI DA ADOTTARE AL FINE DI NON DIFFONDERE L'INFEZIONE**
- **GESTIONE DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA CON RELATIVA LETTERA**



Modelli organizzativi in reparto

- **PRIMARY NURSING CON L'INTEGRAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE A PICCOLE EQUIPE NEI SINGOLI TURNI CON DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E INTERVENTI RELATIVI ALLE DIAGNOSI INFERMIERISTICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI ASSISTENZIALI**

Attività di ricerca e innovazione

- **PARTECIPAZIONE A INCONTRI DI FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE SUL CAMPO CON DISCUSSIONI DI CASI CLINICI CON SUPERVISIONE DELLO PSICOLOGO**
- **PARTECIPAZIONE A LAVORI DI GRUPPO DEL REPARTO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA CON L'OBIETTIVO DI COSTRUIRE STRUMENTI OPERATIVI UTILI ALL'ORGANIZZAZIONE**