



OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome: Peppino Cognome: Antonelli Telefono: 011 2402287 e-mail: peppino.antonelli@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali	Ospedale Giovanni Bosco Nefrologia, VI piano 9 camere, 17 posti letto 13:30 – 14:30 am; 19:00-20:30pm Mattino 7:00 – 14:40 Pom. 14:30 – 22:35 Notte 22:30- 7:00 Nefrologi, coordinatore infermieristico, infermieri,oss/ota, infermiere generico, dietista, assistente sociale
Risorse strumentali	Ecografo, pompe infusionali, pompe nutrizionali occasionalmente, monitor per la rilevazione dei parametri vitali, elettrocardiografo, presidi per la mobilizzazione, monitor cardiaco, carrello dell'emergenza
Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	Servizio mensa, accesso ad internet, biblioteca, tisaneria
Contatti e riferimenti	Indirizzo: Piazza del Donatore di Sangue n.3 Telefono: 011 2402287 Fax: 0112402458
Come raggiungere il servizio Mappa percorso	Da Corso Giulio Cesare, svoltare per via Sempione o per via Porpora, fino ad arrivare in Piazza del Donatore di Sangue 3
Mezzi pubblici	Autobus di linea n. 50 – 27 – 2 – 75 Tram n. 4



Allegato 1

Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche

X

Saltuariamente assistiamo pazienti tossicodipendenti o con potus

Malattie Cardiovascolari

X

Scompenso cardiaco, pregresso IMA, ischemia miocardica, aritmie cardiache

Malattie Cerebrovascolari

X

Vasculiti, tia, pregresso stroke, demenze senili, morbo di Parkinson, stenosi carotidee

Malattie Endocrinologiche, metaboliche

X

Diabete, ipo-ipertiroidismo

Malattie Intestinali / digestive

X

Gastriti, ulcere gastro-duodenali, morbo di Chron, rettocolite ulcerosa,

Malattie Infettive

X

Klebsiella pneumoniae, clostridium difficile, M.R.S.A. , AIDS, epatite B, epatite C, pazienti portatori di infezioni batteriche e virali varie

Malattie Nefrologiche, genito/urinarie

X

IRA, IRC, complicanze dialitiche, pielonefriti, IVU, glomerulo nefriti, malattie autoimmuni, Lupus Eritematoso Sistemico (LES), amiloidosi, vasculiti



Malattie Oncologiche	X
Tumori interessanti tutti i distretti dell'organismo (stomaco, intestino, polmone, rene, cerebrale) ed ematologici	
Malattie Rare	X
Malattie autoimmuni	
Malattie Respiratorie	X
BPCO, versamento pleurico, fibrosi polmonare	
Salute Mentale	X
Sindrome bipolare, schizofrenia, depressione	



Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p>X Perdita reale o percepita di persone significative</p> <p>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p>X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</p> <p>X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> Neonato/bambino: separazione, ambiente e persone sconosciuti, variazioni dei rapporti con coetanei, morte di (specificare) con rituali non familiari e adulti in lutto</p> <p><input type="checkbox"/> Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei</p> <p><input type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio</p> <p>X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</p>	

Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)</p> <p><input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi della tosse/faringeo</p> <p>X Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo)</p> <p><input type="checkbox"/> Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina)</p> <p>X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè)</p> <p><input type="checkbox"/> Fistola tracheo-esofagea</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)</p> <p>Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p>	



<p>Fasi di sviluppo</p>	<input type="checkbox"/> Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo <input type="checkbox"/> Assunzione di alimenti in corso di intossicazione <input type="checkbox"/> Prematuro: compromissione dei riflessi di suzione/deglutizione <input type="checkbox"/> Neonato: riduzione del tono muscolare dello sfintere esofageo inferiore <input type="checkbox"/> Persona anziana: dentizione inadeguata
--------------------------------	--

Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispasia broncopolmonare) X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici) X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche) X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario,insufficiente conoscenza) X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali 	

Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale) <p>Personali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pregressi episodi di autolesionismo <input type="checkbox"/> Abusi fisici, psichici, o sessuali <input type="checkbox"/> Inefficaci capacità di coping X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino/adolescente: correlati all'abuso 	



Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) <input type="checkbox"/> Deturpazione <p>X Squilibri biochimici, neurofisiologici</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa) X Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità <input type="checkbox"/> Insuccesso scolastico <input type="checkbox"/> Relazione inefficace con i propri genitori <input type="checkbox"/> Relazioni abusive <input type="checkbox"/> Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli <input type="checkbox"/> Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione <input type="checkbox"/> Storia di numerosi insuccessi <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neonato/bambino in età prescolare: mancanza di stimoli e vicinanza emotiva, separazione dai genitori/altre persone significative, valutazione costantemente negativa da parte dei genitori, inadeguato sostegno da parte dei genitori, incapacità di fidarsi di altre persone <input type="checkbox"/> Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi) <input type="checkbox"/> Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative <p>X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</p> <p>X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</p>	

Cadute, rischio	X
<p>Vedere lesione, rischio</p>	

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver X Modello di coping inefficace X Salute fisica compromessa X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari X Durata dell'assistenza richiesta X Isolamento X Pause di riposo/svago insufficienti o 	



<ul style="list-style-type: none"> X Risorse economiche insufficienti X Assenza o non disponibilità di sostegno <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)
--

Casa, compromessa gestione	X
-----------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno X Perdita di un familiare X Deficit di conoscenze X Insufficienza di risorse economiche <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino (correlata all'esigenza di cure molteplici) X Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)

Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione	X
(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio <input type="checkbox"/> Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale. X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) <input type="checkbox"/> Paralisi delle corde vocali, tetraplegia <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore) X Mancata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento X Barriere psicologiche (paura, timidezza) <input type="checkbox"/> Mancanza di riservatezza X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino (inadeguata stimolazione sensoriale) X Persona anziana (perdite uditive)
--



X Compromissione cognitiva per (specificare patologia)

Concetto di se, disturbo del

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

Situazionali (personali, ambientali)

- Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa
- X Immobilità o perdita di funzioni
 - Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali
 - Preferenze sessuali
 - Gravidanza nel corso dell'adolescenza
 - Differenza di sesso nell'educazione dei figli
 - Esperienze di violenza da parte dei genitori
- X Cambiamento del consueto modello di responsabilità

Fasi di sviluppo

- X Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)
- X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)

Confusione mentale acuta

X

Fattori correlati

Fattori di rischio

Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per

- X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)
- X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)
- X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)
- X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)
- X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)
- X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)
 - Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)

Trattamenti

- Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenintoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.
- X Dolore, fecaloma, immobilità,
- x Depressione, situazioni non familiari
 - Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)



Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Presenza di batteri, virus, tossine X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali) X Stati patologici pre-esistenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Genere X Storia di fumo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vaccinazioni recenti <input type="checkbox"/> Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione X Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alluvioni, terremoti, disastri naturali. <input type="checkbox"/> Perdite rete fognaria <input type="checkbox"/> Emissioni da impianti industriali: scarichi intenzionali o accidentali di contaminanti da locali commerciali o industriali, inquinamento delle falde acquifere X Fattori fisici: condizioni climatiche, area geografica <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria <input type="checkbox"/> Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori) <input type="checkbox"/> Bioterrorismo X Tipo di lavoro X Pratiche dietetiche <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche X Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Caratteristiche evolutive dei bambini <input type="checkbox"/> Bambini di età inferiore a 5 anni X Persone anziane <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Età gestazionale durante l'esposizione 	

Coping inadeguato della famiglia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori <input type="checkbox"/> Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli 	

Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) 	



- X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
 - Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
 - Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

Trattamenti

- X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione
- X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
 - Disorganizzazione del sistema familiare
 - Inefficace capacità di problem solving
 - Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress
 - Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)
 - Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)
 - Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale (ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

Fasi di sviluppo

- Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi)
- Adolescente: modificazioni fisiche ed emozionali, relazioni sessuali, consapevolezza sessuale, scelte di carriera, indipendenza dalla famiglia, impegni scolastici.
- X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

Cura di sé, deficit (alimentazione)

Incapacità di (specificare):

- X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- X portare il cibo alla bocca

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
 - Spasticità o flaccidità per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
 - Atrofia per (specificare)
- X Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti
 - Regressione a un precedente stadio di sviluppo
 - Comportamenti ritualistici
 - Deficit somatici

Trattamenti



<p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Dolore</p> <p><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Confusione mentale</p> <p><input type="checkbox"/> Ansia che paralizza</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>
--

<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <p>X lavare il proprio corpo o parti</p> <p><input type="checkbox"/> procurarsi l'acqua</p> <p><input type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua</p> <p>X percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</p> <p><input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)</p> <p>X Debolezza muscolare per (specificare)</p> <p><input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</p> <p><input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)</p> <p>X Contratture muscolari per (specificare)</p> <p>X Stato comatoso</p> <p>X Disturbi visivi</p> <p><input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti</p> <p><input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</p> <p><input type="checkbox"/> Deficit somatici</p> <p>Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Dolore</p> <p><input type="checkbox"/> Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Confusione mentale</p> <p><input type="checkbox"/> Ansia che paralizza</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>
--



<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</p> <p>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo 	



<input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici Trattamenti <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> usare il telefono <input type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> lavare e stirare <input type="checkbox"/> preparare i pasti <input type="checkbox"/> fare la spesa <input type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci	X
--	----------

Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatiformi Trattamenti <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
--	----------



Deglutizione, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore crebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) <input type="checkbox"/> Tumore / edema tracheo-esofageo X Irritazione della cavità orofaringea X Diminuzione della salivazione <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso <input type="checkbox"/> Riduzione della coscienza per anestesia <input type="checkbox"/> Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica X Esofagite da radioterapia <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del livello di coscienza X Fatigue <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto 	

Fatigue	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> x Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza) x Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) x Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS) <input type="checkbox"/> Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia, <input type="checkbox"/> Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) <input type="checkbox"/> Eccessive richieste di ruolo <input type="checkbox"/> Richieste emozionali soverchianti X Stress emotivo X Disturbi del sonno 	



Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</p> <p>Trattamenti</p> <p>X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare)</p> <p>X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare)</p>	

Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Riduzione del sensorio</p> <p>X Stato di incoscienza</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)</p> <p>X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)</p> <p>X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)</p> <p>X Cancro</p> <p>Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Intervento chirurgico</p> <p><input type="checkbox"/> Ventilazione meccanica</p> <p><input type="checkbox"/> Linee venose</p> <p><input type="checkbox"/> Trazione/gesso/tutore ortopedico</p> <p>X Immobilità prescritta</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Depressione</p> <p>X Fatigue</p> <p>X Stato di debilitazione</p> <p>X Dolore</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida</p> <p>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</p>	

Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)</p> <p><input type="checkbox"/> Compromissione delle funzioni cognitive</p> <p><input type="checkbox"/> Iperdistensione rettale per stipsi cronica</p> <p>X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)</p> <p><input type="checkbox"/> Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.</p>	



Situazionali (personali, ambientali)

- X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

Incontinenza urinaria da urgenza

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo

Trattamenti

- X Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale,
- X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza

Situazionali (personali, ambientali)

- X Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi
- X Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti

Fasi di sviluppo

- Bambino: limitata capacità vescicale
- X Persona anziana: diminuita capacità vescicale

Incontinenza urinaria funzionale

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva

Trattamenti

- X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti

Situazionali (personali, ambientali)

- X Compromissione della mobilità
- X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)

Fasi di sviluppo

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria
- X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

Trattamenti

- Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- Strumentazione diagnostica
- X Riduzione del tono muscolare per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici,



<p>anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione della mobilità</p> <p>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</p> <p><input type="checkbox"/> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>

Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</p> <p>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</p> <p>Trattamenti</p> <p><input type="checkbox"/> Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</p> <p><input type="checkbox"/> Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio</p> <p><input type="checkbox"/> gessato, pieghe cutanee)</p> <p>x Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo</p> <p><input type="checkbox"/> Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali</p> <p>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</p>	

Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)</p> <p>X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</p> <p>X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</p> <p>X Eccessivo dormire di giorno</p> <p>X Depressione</p> <p><input type="checkbox"/> Inadeguata attività fisica durante il giorno</p> <p>X Dolore cronico</p> <p>X Risposte ansiose</p>	



- X Modifiche ambientali (specificare)
- X Paura
 - Frequenti risvegli dei bambini
 - Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa)

Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia,.

Integrità mucosa orale, compromissione

X

Fattori correlati

- X Inadeguata igiene orale
- X Incapacità di provvedere all'igiene orale

Ipertermia

X

Fattori correlati

Trattamenti

- Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)

Situazionali

- Esposizione al calore, al sole
- X Abbigliamento inadeguato al clima
- X Assenza di condizionamento dell'aria
- Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero
- X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)
- X Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa

Fasi di sviluppo

- X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età

Ipotermia

X

Fattori correlati

Situazionali (personali, ambientali)

- Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento
- X Vestiario inadatto al clima
- Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento
- X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)

Fasi di sviluppo

- X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)

Lesione, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)
- X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- X Fatica
- X Ipotensione ortostatica



<p>Trattamenti</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>Fasi di sviluppo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Insufficienza vertebro basilare <input type="checkbox"/> Disturbi vestibolari <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <input type="checkbox"/> Movimenti tonico-clonici (convulsioni) <input checked="" type="checkbox"/> Lungo allettamento <input checked="" type="checkbox"/> Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare) <input type="checkbox"/> Gesso, stampelle, deambulatore, bastone <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione o perdita memoria a breve termine <input checked="" type="checkbox"/> Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione) <input type="checkbox"/> Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio) <input type="checkbox"/> Pericoli legati all'uso dell'automobile (cinture, sedile di sicurezza per bambini, meccanica del veicolo non sicura) <input type="checkbox"/> Pericolo di incendio <input checked="" type="checkbox"/> Ambiente non familiare (es. Ospedale) <input checked="" type="checkbox"/> Scarpe inadatte, <input type="checkbox"/> Disattenzione del caregiver <input checked="" type="checkbox"/> Uso improprio degli ausili <input type="checkbox"/> Storia di incidenti <input checked="" type="checkbox"/> Andatura instabile <input type="checkbox"/> Bambino: inadeguata consapevolezza dei pericoli <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare
---	--

Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione) <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi) <input type="checkbox"/> Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento <input type="checkbox"/> Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia <input checked="" type="checkbox"/> Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore <input type="checkbox"/> Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata) 	

Liquidi, eccessivo volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema) 	



- X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

Trattamenti

- X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea)
 - Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)
 - Compromissione venosa da utero gravido

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

Liquidi, insufficiente volume di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
 - Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni
- X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Vomito/nausea
 - X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
 - X Dieta scorretta/digiuno
 - Nutrizione per sonda con soluzione concentrata
- X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
 - Esposizione a climi estremi
- X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
 - Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche
- X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

Fasi di sviluppo

- Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine)
- X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

Memoria, compromissione

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)
- X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)
- X Deficienze nutrizionali

Trattamenti

- Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni

Situazionali (personali, ambientali)

- Aspettative che si auto realizzano
- X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)
- Consumo di alcol



- Mancanza di motivazione
- Inadeguata stimolazione
- Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)

Mobilità, compromissione /rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
 - rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- edemi
- apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)
 - forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

Situazionali (personali, ambientali)

- fatigue
- obesità
 - mancanza di motivazione
- dispnea
- dolore

Fasi di sviluppo

- Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite
- Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio

Vedere mobilità, compromissione, rischio

X

Nausea

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare)

Trattamenti

- Effetti della chemioterapia e/o farmaci
- Effetti dell'anestesia



Non adesione (a indicazioni terapeutiche)		X
Fattori correlati		
Fisiopatologici	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) <input checked="" type="checkbox"/> Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato 	
Trattamenti	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Effetti collaterali della terapia <input type="checkbox"/> Ambiente non terapeutico <input checked="" type="checkbox"/> Terapia complessa non controllata/prolungata <input type="checkbox"/> Costo economico della terapia <input type="checkbox"/> Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace <input type="checkbox"/> Processo di presa in carico impersonale (multi professionale) 	
Situazionali (personali, ambientali)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente) <input type="checkbox"/> Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) <input type="checkbox"/> Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio <input type="checkbox"/> Modificazione dello stato lavorativo <input type="checkbox"/> Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie <input checked="" type="checkbox"/> Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali) 	

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di		X
Fattori correlati		
Fisiopatologici	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS) <input checked="" type="checkbox"/> Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) <input type="checkbox"/> Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia <input checked="" type="checkbox"/> Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico) <input checked="" type="checkbox"/> Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare) <input type="checkbox"/> Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi) <input checked="" type="checkbox"/> Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite) <input checked="" type="checkbox"/> Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica) <input checked="" type="checkbox"/> Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante) <input checked="" type="checkbox"/> Inappetenza per reflusso gastroesofageo 	
Trattamenti	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia) <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare) <input type="checkbox"/> Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia) 	
Situazionali (personali, ambientali)		



<p>Fasi di sviluppo</p>	<p>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</p> <p><input type="checkbox"/> Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)</p> <p>X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)</p> <p>X Diarrea</p> <p><input type="checkbox"/> Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)</p> <p>X Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)</p> <p><input type="checkbox"/> Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)</p> <p><input type="checkbox"/> Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)</p>
--------------------------------	---

Nutrizione superiore al fabbisogno	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> Alterato modello di sazietà (specificare)</p> <p><input type="checkbox"/> Riduzione dei sensi di gusto/olfatto</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Rischio di aumento ponderale in gravidanza superiore a 12/13 Kg</p> <p><input type="checkbox"/> Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico</p>	

Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)</p> <p>X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia)</p> <p><input type="checkbox"/> Soppressione del riflesso della tosse</p> <p><input type="checkbox"/> Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)</p> <p><input type="checkbox"/> Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)</p>	

Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)</p>	



X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)

X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)

X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)

X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare

Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile

Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)

Trattamenti

X Effetti collaterali di farmaci (specificare)

X Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica

X Uso abituale di lassativi

Mucosite secondaria a radiazioni

Situazionali (personali, ambientali)

X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)

X Modello di evacuazione irregolare

Credenze culturali/sulla salute

X Mancanza di riservatezza

X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata

Paura di dolore rettale o cardiaco

Valutazioni errate

X Incapacità di percepire i segnali intestinali

Stress, sovraccarico psicofisico

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

Situazionali (personali, ambientali)

Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)

Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra

Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)

Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali

X Perdite funzionali



Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
RC per calcoli renali	X



Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Accoglienza mirata del paziente che accede nel reparto in base all'ipotesi diagnostica, alla tipologia di ricovero, alle differenti complessità assistenziali.
- Individuazione di segni e sintomi di possibili complicanze di un paziente con IRA, IRC in trattamento dialitico, con trapianto renale (iperpotassiemia, iponatremia, aritmie, alterazione della diuresi, alterazione dello stato di coscienza, ipertensione, anemizzazione, iper o ipoglicemie, iperazotemia.... Prevenzione delle complicanze e interventi d'urgenza.
- Assistenza del paziente durante tutto il suo percorso, dal ricovero alla dimissione.
- Preparazione e assistenza del paziente prima, durante e dopo l'esecuzione di: Biopsia Renale, ecodoppler, TAC con m.d.c., seduta dialitica (emodialisi o dialisi peritoneale); conoscenza dei protocolli assistenziali relativi alla fase pre e post dialitica, dei diversi tipi di dialisi, degli accessi vascolari per Dialisi e della loro gestione, delle complicanze alle quali possono andare incontro e della loro prevenzione.
- Applicazione dei programmi terapeutici quali: diuretici, antiipertensivi, immunosoppressori, cortisonici, chelanti del fosforo, eritropoietina, anticoagulanti. Conoscenza e gestione degli eventuali effetti collaterali e tossici dei farmaci.



- Valutazione della compliance del paziente in relazione all'assunzione delle terapie e all'effettuazione degli esami diagnostici.
- Attuazione degli interventi assistenziali per prevenire o trattare complicanze nei pazienti con cateteri venosi centrali (Catetere di Tesio o femorale per dialisi), cateteri periferici, fistola artero-venosa.
- Riconoscimento e gestione delle situazioni acute critiche quali: EPA, iperazotemia, iperpotassiemia, anuria, anemie, allergie da farmaci, shock ipovolemico, arresto cardio-circolatorio, broncospasmo, ecc.
- Educazione sanitaria nei confronti dei pazienti, relativa al cambiamento dello stile di vita in rapporto all'inizio della dialisi o al trapianto (dieta, terapie a domicilio, inizio terapia insulinica, controlli da farsi, pulizia, vacanze, accettazione e assunzione della terapia, aiuti vari che si possono ricevere a domicilio, trasporto da e per il centro dialisi.
- Conoscenza e sperimentazione dell'organizzazione per piccole equipe.
- Possibilità di dedicarsi a lavori di studio guidato e di ricerca.